

RS Sugawara, Toshiyasu
180 Honzo tsukan
J3S8
1937
v.11

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

問 顧

井上通泰先生
山田孝雄先生
新村 出先生

正宗敦夫

編纂
校訂

本草通串


自四十三卷
至四十五卷

合資
會社


日本古典全集刊行會壽梓

長嶋豐太郎精刻

RS
180
J358
1937
v. 11



本草通串卷四十三



富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

前胡

前胡味苦微寒無毒主療痰滿腎脅中痞心腹結氣
風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益
精二月八月採根暴乾名醫別錄○
大觀本草

前胡別錄中品集解別錄曰前胡二月八月采根暴乾主

治痰滿胸脇中痞心腹結氣風頭痛去痰下氣治傷

寒寒熱推陳致新明目益精名醫別錄本草綱目○

前胡味苦微寒無毒主療痰滿胸脇中痞心腹結氣

風頭痛去痰實熱下氣治傷寒寒熱推陳致新明目

益精二月八月採根暴乾名醫別錄千金翼方○

本草云主痰滿胃脇中痞心腹結氣風頭痛去痰實

下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精名醫別錄湯液本草○

前胡味苦微寒無毒主痰滿胸脇下痞心腹結氣風

頭痛去痰下氣治傷寒寒熱推陳致新

名醫別錄○本草經疏輯

要

皆不行而進謂之毒从止在舟上昨先切胡牛顛坐

也从肉古聲戶孤切

說文

陶隱居云前胡似茈胡而柔軟爲療殆欲同而水經上品有茈胡而无此晚來醫乃用之亦有畏惡明異惡非盡出本經也此近道皆有生下濕地出吳興者爲勝

神農本草陶弘景註○大觀本草

集解弘景曰近道皆有生下濕地出吳興者爲勝根

似柴胡而柔軟為療殆欲同之本經上品有茺胡而

無此晚來醫乃用之

神農本草陶弘景
註○本草綱目

雷公云凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗酸

苦誤用令人胃反不受食若是前胡味甘微苦凡修

事先用刀刮去蒼黑皮并髭土了細剉用甜竹瀝浸

令潤於日中曬乾用之

炮炙論○
大觀本草

集解數曰凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗

酸苦誤用之令人反胃不受食若是前胡味甘微苦

也修治修事先用刀刮去蒼黑皮并髭土了細剉以

甜竹瀝浸令潤日中熬乾用炮炙論○本草綱目

半夏爲之使惡皂莢畏藜蘆藥對○大觀本草

氣味之才曰半夏爲之使惡皂莢畏藜蘆藥對○本草綱目

半夏爲使惡皂莢畏藜蘆藥對○湯液本草

前胡使味甘辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單

煮服佳藥性論○大觀本草

氣味權曰甘辛平主治能去熱實及時氣內外俱熱

單煮服之甄權藥性論○本草綱目

前胡和名字多奈一名乃世利本草和名

臣禹錫等謹按藥性論云前胡使味甘辛能去熱實

下氣主時氣內外俱熱單煮服佳

蜀本草禹錫按○大觀本草

肯不行而進謂之肯從止在舟上臣鍇曰莊子曰坐

而至越者舟也自先反

胡

牛領垂也從肉古聲臣鍇

曰牛領下垂皮也魂徒反

說文解字通釋

雜給料

ミハク前胡

二斤八兩二分○齋宮料五十三種

ミハク前胡

二升一合○草藥八十種

ノゼリ前胡

一斤○伊

賀國北三種

前胡八斤○伊勢國五十種

前胡

一斤○相摸國北二種

コノリ前胡

一斤○下總國三十

六種 前胡二斤○近江國七十三種 前胡^{コナリ}十斤

五兩○丹波國四十三種 前胡^{コナリ}十二斤○但馬國

北一種 前胡五斤○播磨國五十三種 前胡二

斤○安藝國卅二種 前胡六斤^{延喜式}

日華子云治一切勞下一切氣止嫩破癥結開胃下

食通五藏主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安

胎小兒一切疳氣越衝發睦等處皆好七八月採外

黑裏白^{日華本草}
^{大觀本草}○

集解大明曰越衝發睦等處者皆好七八月采之外

黑裏白主治治一切氣破癥結開胃下食通五臟土

霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘欬嗽安胎小兒

一切疳氣

大日華子大明
明○本草綱目

圖經曰前胡舊不著所出州土今陝西梁漢江淮荆

襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似斜蒿

初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月

內開白花與蔥花相類八月結實根細青紫色二月

八月採暴乾今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡

赤色而脆前胡黃而柔軟不同耳一說今諸方所用

前胡皆不同京師北地者色黃白枯脆絕无氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微又如草烏頭膚黑而堅有兩三歧爲一本者食之亦戟人咽喉中破以薑汁漬搗服之甚下膈解痰實然皆非前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦浚苦療痰下氣最要都勝諸道

者
圖經○大觀本草

集解頌曰今陝西梁漢江淮荆襄州郡及相州孟州

皆有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月內開白花與蔥花相類八月結實根青紫色今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔軟爲不同爾一說今諸方所用前胡皆不同汴京北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微一種如草烏頭膚赤而堅有兩三歧爲一本食之亦戟人咽喉中破以薑汁漬搗服之甚下膈

解痰實然皆非真前胡也今最上者出吳中又壽春

生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦濃苦療痰下氣最

勝諸道者

蘇頌圖經○
本草綱目

絳州前胡

江寧府前胡

成州前胡

建州前胡

二月八月
採根暴乾

淄州前胡

備急本
草圖按

前胡氣微寒味苦無毒○本草云主痰滿胃脇中痞

心腹結氣風痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新

明目益精半夏爲使惡皂莢畏藜蘆

湯液
本草

前胡味苦微寒無毒下氣消痰推陳致新安胎止嗽

○前胡 柴胡 功無優劣通醫熱病主療傷寒 ○前胡

除内外之痰實 李杲藥性賦

西天蔓 前胡 胡錄 耕

前胡 生陝西漢梁江淮荆襄江寧成州諸郡相孟

越衢婺睦等州皆有今密縣梁家衛山野中亦有之

苗高一二尺青白色似斜蒿味甚香美葉似野菊葉

而瘦細頗似山蘿蔔葉亦細又似芸蒿開豔白花類

蛇床子花秋間結實根細青紫色一云外黑裡白味

甘辛微苦性微寒無毒半夏爲之使惡皂莢畏藜蘆

救飢

採葉燂熟換水浸淘淨油塩調食

救荒本草○農

政全書

前胡生陝西

梁江淮荆襄江寧咸州諸郡相孟越

衢婺睦等州皆有今密縣梁家衝山野中亦有之苗

高二三尺青白色似斜蒿味甚香美葉似野菊葉而

瘦細頗似山蘿蔔葉亦細又似芸蒿開黥白花類蛇

床子花秋間結實根細青紫色一云外黑裏白味甘

辛微苦性微寒無毒半夏爲之使惡皂莢畏藜蘆

救飢採葉燂熟換水浸淘淨以油塩調食

治病具

見本草

救荒本草○
古今醫統

前胡味苦氣微寒無毒山谷多產秋月採根色白蕭

黃氣香甚竄凡用入藥須日曝乾畏藜蘆惡皂莢以

半夏爲使去痰實如神胸膈中痞滿立除心腹內結

氣卽逐治傷寒寒熱又推陳致新消風止頭疼保嬰

利疳氣

本草
蒙筌

前胡味苦甘辛性微溫無毒入肺肝脾膀胱四經主

傷寒痰嗽痞滿心腹結氣解熱開胃推陳致新亦止

夜啼兒佐使畏惡同柴胡 按前胡辛可暢肺以解

風寒甘可悅脾以理胃腹若能泄厥陰之火溫能散

太陽之邪

雷公云

凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗酸若誤用令人胃反

不受食若是前胡味甘氣香凡修事先用刀刮去蒼黑皮并鬚土細剉用甜竹漚浸令潤於日中曬乾用之

製藥性解

釋名時珍曰按孫愐廣韻作洵胡名義未解集解時

珍曰前胡有數種惟以苗高一二尺色似斜蒿葉如

野菊而細瘦嫩時可食秋月開紫白花類蛇牀子花

其根皮黑肉白有香氣爲真大抵北地者爲勝故方

書稱北柴胡云主治

清肺熱化痰熱散風邪

時珍

發明

時珍曰前胡味甘辛氣微平陽中之陰降也乃手足
太陰陽明之藥與柴胡純陽上升入少陽厥陰者不
同也其功長于下氣故能治痰熱喘嗽痞膈嘔逆諸
疾氣下則火降痰亦降矣所以有推陳致新之績爲
痰氣要藥陶弘景言其與柴胡同功非矣治證雖同
而所入所主則異

本草綱目

前胡味苦微甘氣溫無毒陽中陰降也乃手足太陰
陽明之藥與柴胡清陽上升入手足少陽厥陰者不
同也

蘇氏曰前胡南北諸道皆有生下濕地今出吳興者功勝初春生苗青白色似斜蒿初出有白

芽長三四寸味甚香美七月開紫白花與蔥花相似
 八月結實根青紫色乾則外黑內黃白八月採根暴
 乾苗生柴胡之前故名前胡○王氏曰前胡南北皆
 有其品甚多良醜不一又汁京北地者色黃白枯脆
 絕無氣味江東有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃
 而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香
 味俱微一種似草烏頭膚赤而堅有兩三歧食之戟
 人咽喉惟以薑汁浸搗服之能下膈問疲結皆非真
 前胡也今最上者出吳中及壽春皆類柴胡氣芳烈
 味亦濃苦療痰下氣最勝諸道者○李蕡湖曰前胡
 有數種惟以苗高二尺色似斜蒿葉如野菊而細
 瘦嫩時可食秋月開紫白花又類蛇床子花其根皮
 黑肉白有香氣為真大抵北地者為勝故方書稱北
 前胡云○一種野蒿根類前胡悞用令人反胃不受
 食真前胡味苦微甘野○前胡散風寒淨表邪溫肺
 蒿根味苦微酸可別也○氣消痰嗽之藥也如傷風之證咳嗽痰喘聲重氣盛

此邪在肺經也傷寒之證頭痛惡寒發熱骨疼此邪在膀胱經也胸脇痞滿氣結不舒此邪在中膈之分也又妊娠發熱飲食不甘小兒發熱瘡疹未形大人痰熱逆氣隔拒此邪氣壅閉在膜理之間也用前胡俱能治之但苦辛而溫能散有餘之邪熱實痰而不
可施諸氣虛血少之病故凡陰虛火熾煎熬真陰凝結爲痰而發咳嗽者真氣虛而氣不歸原以致胸脇逆滿者頭痛骨疼不因于痰而因于陰血虛少者內熱心煩外現寒熱而非外感者法並禁用大抵此劑

與柴胡不同柴胡性味寒苦入少陽厥陰治在半表
半裏以清往來之熱前胡性味溫辛入太陽太陰專
□□病之時以清表間之熱然柴胡之性專于上升
而前胡之功專于下氣故治痰熱喘嗽痞膈逆氣胎
脹諸疾氣降則痰降痰降則火亦降矣與柴胡治證
不同而所入所主亦有異耳○金靈昭先生曰前胡
辛溫而散功能下氣治寒熱喘嗽復能外出又可退
瘡痰出痘疹柴胡苦寒而清功能上行清陽升引胃
氣上達而復能降入又可調血和營出入升降二藥

各自有互通之用也○門人羅一經曰前胡去寒痰半
夏去濕痰南星去風痰枳實去實痰葶仁治燥痰貝
母麥門冬治虛痰黃連天花粉治熱痰各自有別也
本草彙言

前胡出羌胡根蒼黑氣香肉黃苗比柴胡先生故名

前胡

味苦微寒無毒主療痰滿胸脇中痞心腹結氣
風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明

目益精

○吳興出者勝大類柴胡但柴胡赤色而脆
前胡黃而柔軟氣甚芳烈味亦濃苦不同耳○水洗

淨刮去皮竹

瀝浸晒乾用

雷公云

凡使勿用野蒿根緣真似前
胡只是味粗酸若誤用令人

胃反不受食若是前胡味甘氣香凡修事先用刀刮
去蒼黑皮并髭土細剉用甜竹瀝浸令潤於日中晒

乾用本草
之原始

前胡 西天蔓事物
異名

前胡叶 味辛性微寒味甘辛無毒治一切勞下
一切氣療痰滿胃脇中痞心腹結氣去痰實下氣止
嗽開胃下食○處處有之二月八月採根暴乾用之

本草
東醫
寶鑑

前胡 辛以暢肺解風寒甘以悅脾理胸腹苦泄厥
陰肝之熱寒散太陽膀胱之邪微寒一性陰而降功尚
下氣氣下則火降而痰消氣有餘便是
火火則生痰能除實熱治

痰熱哮喘咳嗽嘔逆痞膈霍亂小兒疳氣有推陳致

新之績明目安胎無外感者忌用

按柴胡前胡均是風藥但柴胡性升

前胡性降爲不同肝胆經風疾非前胡不能除

皮白肉黑味甘氣香者良

半夏爲使惡皂莢忌火

增訂本草備要

前胡得土食之氣感秋冬之令陽中之陰降也入肺

脾胃大腸經其功長於下氣與柴胡純陽上升者不

同故治一切氣破痰結及邪熱骨節煩悶氣喘咳嗽

痰熱之要藥

同白前杏仁桑白皮甘草桔梗能豁

風熱痰壅喘嗽

入礞石滾痰丸中代黃芩治一切

實痰有殊功其用黃芩者不若此也 此散有餘邪

熱實痰之藥不可施諸氣虛少血之病凡陰虛火熾

煎熬真陰凝結爲痰而放咳嗽真虛氣不歸元以致

胸膈逆滿頭痛由於血虛寒熱不是外感者法並禁

用

本草經
疏輯要

前才延切音錢後之對也先也進也○本作𦵏說文

不行而進謂之𦵏从止在舟上徐曰坐而至者舟也

篆作𦵏𦵏从𦵏从刀斷物也今以前爲𦵏字又加刀

作剪非○

胡洪吾切音乎前胡柴胡藥名

通正字

西天蔓

清異錄侯寧極藥譜西天蔓前胡也

事物異名

錄

前先濁

才先切音錢後之對也先也進也○本作毒

前卽剪也今以前爲毒字又从刀作剪非景字

增本草綱目

前胡

孫愐唐韻作前胡

蘇頌曰陝西梁漢江淮

荆襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似邪

蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七

月內開白花與蔥花相類八月結實根青紫色今鄜

延將來者大與紫胡相似但紫胡赤色而脆前胡黃

色而柔軟爲不同耳一說今諸方所用前胡皆不同
汴京北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四
種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種
色理黃白似人參而細短香味都微一種如草烏頭
者膚赤而堅有兩三歧爲一本皆非真前胡也今最
上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味
亦濃若李時珍曰前胡有數種惟以苗高一二尺色
似邪蒿葉如野菊而細瘦嫩時可食秋月開黪白花
類蛇牀子花其根皮黑肉白有香氣爲真大抵北地

者爲勝故方書稱北前胡云氣味苦微寒無毒治一切氣破癥結開胃下食通五臟主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘咳嗽安胎小兒一切疳氣清肺熱化痰熱散風邪

別錄增炮炙論凡修治先用刀刮去

蒼黑皮並髭細剉以甜竹瀝浸令潤日中曬乾用

廣群

譜芳

藥屬

前胡

蕪湖縣志

藥屬

前胡

重修江府志

藥之屬

前胡

孫愐作湔胡一種野蒿根類前胡愐

用令人反胃真前胡味苦微甘野蒿根味苦微酸

別也

杭州府志

藥之屬

前胡

福州府志

前胡

名醫別錄

各處皆有出吳興者為勝根似柴

胡而柔軟水經上品有柴胡而無此晚來醫用之

湖州

府志

藥之屬

有前胡

孫恂唐韻作湔胡有一種野蒿根

類前胡悞用令人反胃真前胡味苦微甘野蒿根味

苦微酸可別也

錢塘縣志

樂類

前胡

遂安縣志

前古文嘉祐唐韻昨先切集韻韻會正韻才先切並

音錢增韻前後之對又進也廣韻先也康熙字典

前胡

和名

宇ウ太タ奈ナ今ミ按ツ美ミ豆ツ波バ久ク左サ
多識編

前胡

ウタナ又ノゼリ藻鹽

前胡

俗名他尼石里

山城

陶隱居云前胡似柴

胡而柔軟為療殆欲同而本經上品有柴胡而無此

晚來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此

近道皆有生下濕地出吳興者為勝臣禹錫等謹按

藥性論云前胡使味甘辛能去熱實下氣主時氣內
外俱熱單煮服佳日華子云治一切勞下一切氣止
嗽破癥結開胃下食通五藏主霍亂轉筋骨節煩悶
反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切疳氣越嚮癰腫等處
皆好七八月採外黑裏白

嘉祐補
註本草

前胡舊不著所

出州土今陝西梁漢江淮荆襄州郡及相州孟州皆
有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四
寸味甚香美又似芸蒿七月內開白花與蔥花相類
八月結實根細青紫色二月八月採暴乾今鄜延將

來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔
軟不同耳一說今諸方所用前胡皆不同京師北地
者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類
當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白
似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚黑而堅
有兩三歧爲一本者食之亦戟人咽喉中破以姜汁
漬搗服之甚下膈解痰實然皆非前胡也今最上者
出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦濃
苦療痰下氣最要都勝諸道者

本草
圖經

前胡按孫愐

唐韻作湔胡名義未詳

明李東璧本草綱目

前胡有數種惟

以黃高一二尺色似斜蒿葉如野葛而細瘦嫩時可

食秋月開黪白花類蛇牀子花其根皮黑肉白有香

氣爲真大抵北地者爲勝故方書稱北前胡云

同上

前胡陰西漢梁江淮荆襄江寧成州諸郡相孟越

衢婺睦等州皆有今密縣梁家衝山野中亦有之苗

高一二尺青白色似斜蒿味甚香美葉似野菊葉而

瘦細頗似山蘿蔔葉亦細又似芸蒿開黪白花類蛇

牀子花秋間結實根細青紫色一云外黑裏白味甘

辛微苦性微寒無毒半夏爲之使惡阜英畏藜蘆救

飢抹葉煉熟換水浸淘淨油塩調食

明徐光啓
農政全書

前

胡似莖胡而柔軟

八閩
通志

前胡色似斜蒿葉如野菊

而細瘦

重修
江縣志

前胡卽全胡

清釋傳傑
廣物
癘瘍全書類纂

前胡甘辛平微寒去蘆用半夏爲使惡阜英畏藜蘆

前胡草狀屢改觀註本草者誤謂有三四種究其

實卽是一物也生下濕地其根白色但藥中取貯者

俱夏月采之且不極洗淨故體不實而色亦淡黑香

味都不佳其云葉如野菊根皮黑肉白者皆謬說

本草

喉襟

前胡

一作洵胡

和爾雅

前胡

洵胡

俗云美都波久佐

本綱前胡生下

濕地有數種春生苗高一二尺青白色似斜蒿葉如

野菊而細瘦嫩時可食秋月開黦白花類蛇牀子花

根皮黑肉白有香氣爲真大抵北地者爲勝

故稱北前胡

野蒿根甚相似而味粗酸苦誤用之令人反胃不受

食氣味

苦微寒又云甘平

陽中之陰降也乃手足太陰陽明

之藥能下氣故治痰熱喘嗽痞膈嘔逆諸疾氣下則

火降矣所以有推陳致新之績為疲氣要藥此與紫

胡治證雖同而所入所主則異

以半夏為使惡
阜莢畏藜蘆

△按

前胡

味始甘
而終苦

倭漢形狀氣味有異同蓋漢之前胡亦

有數種則其中異種者乎和州金剛山之產為上防

州及藝州廣島備中平福之產次之苗高一二尺葉

似桑葉而無鋸齒兩兩對生八九月開黃花似施覆

花有白花者並十月結實有稜似牽牛子黑色

倭漢
三才

圖會

前胡

和名

ウタナ

武州ノ山野ニ皆有之初

出ハ三ツ葉芥ノ如ク一莖二三葉ヲ付ク老枝ハ
八九葉ヲ付白芷ノ如シ七八月ニ至テ高サ三五
尺其上ニ黒ミノ花ヲ出ス花ノ形モ白芷ノ如ニ
シテ少シ小也子モ苗番ニ似タリ根ハ舶來ト相
同シ藥用ニ可入本草花
蒔繪

前胡釋名李昉曰苗比柴胡先生修治洗土氣去蘆
頭劉日干用別野蒿者根葉尤相類野蒿味酸誤用
反胃宜辨之氣味苦甘辛微寒無毒能入肺脾胃大
腸四經主下氣散結消痰定喘消食安胎治傷寒寒

熱清肺熱化痰熱散風邪毒若不因外感之痰及陰
 虛火動者俱當速之修治本書ノ如シ和ヨシ用ベ
 シサレ氏取時アシキ故輕虛ニノ香氣少シ秋冬
 取りタルハ氣味各別ヨク大ナルハヤガテ花咲
 ントス花咲ケバ根クツル種ヲマイテ二三年ニ
 テ花咲ク能肥ヘタルハ翌年ニテモ花咲ク時珍
 云根皮黒肉白シト云ヘ氏能土ヲ洗ヘバ皮モ白
 シ叡山ノ下モ或ハシル谷タニハ越南禪寺ニモアリ水氣
 アル濕地ニアルモノナリ氣味苦微寒能本書ノ

如シ此藥下氣ヲ主トス氣下レバ火下ル火下レ
バ痰モ下ル痰氣ノ要藥ナリ傷寒寒熱時氣内外
氏ニ熱スルニ用ユ柴胡前胡氏ニ風藥ナリ柴胡
主升^ヲ前胡主降^ヲ片玉六
八本草

前胡 和真ナリタゞ藥肆ノモノ採收ルノ時ア
シキハ輕虛ニシテ性アシク香氣少シ秋冬ノ際
可^ニ自^ラ採擇^ヲ 全胡 前胡ナリ轉^ニ用藥^ヲ
音ニ係ル 須知

前胡 ノタケ 諸説不一^ヲ時珍ノ説可^キ爲^ニ正^{ナリ}
葉ハ石竹ニ似タリ花ハ敗醬ニ似タリ竹葉ナル

ヲ真トスベシ長サ一二尺ト云モノハ銀柴胡ヲ
云ト見ヘタリ 新校正云タニゼリ 本草
會誌

前胡 ノタケ タニゼリ 斜蒿ハ青蒿葉ノモ

ノニ非ス別物ナラン野菊葉ニ似タリト云モノ

可^レ考古來ミツヨツバト云山蘿蔔ニ似タルハ小

前胡ナリ大抵ハ小葉ナリ芸蒿ニ似タリト云モノ

河原柴胡ニノ不類又豆葉ノモノニ非ス外黑裡

白ハ大葉ナリ此モノ甚辨シヤスカラズ別ニ云

ベシ

救荒本草
臆斷

前胡 コマゼリ ノゼリ タニゼリ ミツバ

クサ 式延喜 ウタナ ウマゼリ ヤマゼリ ノ

タケ 前筑 今ハ通名 一名 西天蔓 韋耕 蜘蛛香菜

本草 鄉藥 全胡 痰火 射香菜 村家 向陽ノ山野ニ

多ク生ズ初テ生ズル者ハ只三葉ナル故ニミツ

バグサト云長スルニ隨ヒ數岐ヲ分チ大ニナリ

大抵二活ノ輩ニ類ノ同ジカラズ莖ヲ起ス者ハ

高サ七八尺葉互生ス秋ニ至リ枝端ニ花ヲ開ク

胡蘿蔔ノ如ク傘ヲナシテ簇生ス紫黑色又白色

ナル者アリ一種細葉ノ前胡アリ和州ニ多シ葉
 細長ク歧多クノ當歸葉ノ如シ花實ノ形狀ハ異
 ナラズ市中ニ舶來ノ者稀ニアリ和ハ和州ヨリ
 多ク出ス又田舎^{イナカ}前胡ト呼モノハ黒色ニシテ下品
 ナリ又若州及江州ノ朽木葛川ヨリ出スモノハ
 堅實ニシテ^{エグミ}茶味アリ甚下品ナリ凡陳舊ナル者ハ
 惡シ本草綱目^{本草綱目}啓蒙

西天蔓 センゴナリ○前胡 前胡ナリ^{藥品手引草}

前胡

和名

ミツバクサ

一名ノダケ

筑前

一名

ミツバ 山城 白川

一名タニゼリ 京

處處多アリ花

紫白ノ二色アリ大和上品備中平福安藝廣島次

之三種アリ山城ハウニ似タリ又アサニニ似

タルアリ又車前ニ似タルアリ藥家ニ小前胡ヲ

上品トス

千金方
藥註

前胡 和真ナリ然レ氏一種葉大ニノ白花ヲ開

ク物アリ前胡ニアツ真ニ非ズ 本草
正譌

前胡 和名ミツバクサ 延喜
式

タニゼリ ノダ

ケ 唐人參 松岡

ウタナ

本草
和名

コ、ニ云フ説ニ

因テ考レハ前胡一種細葉ノモノアリ カハゼ
ンゴト云和州ニ多シ葉細長ク岐多クシテ當歸
葉ノ如シ花實ノ形狀ハ異ナラズコノモノヨク
當レリ西湖曰肥後ニ産スルモノ葉尤小ニノ野
菊ノ如シ根莖花實ノ形モ時珍説トコロト相合
スト云モノ是ナリ江州地方山中ニアルモノ初
生三葉ヲ生シテ獨活嫩葉ニ似リ長スレハ藁本
葉ニ似テ粗大莖紫色秋ニ至テ高サ四五尺梢ニ
傘狀ヲナシテ花アリ小碎紫黑色又白花ノモノ

武州道灌山中稀ニアリ救荒本草通解

前胡 和名ウダナ 本草 和名 ノゼリ 同上 ミツバク

サ延喜式 タニセリ ノダケ 和産前胡三種ア

リ 一種ハ和俗カハゼンゴト呼モノアリ和州

ニ産ス春宿根ヨリ生ス葉ハ當歸葉ノ如クニノ

細ク短ク秋月莖高サ二三尺梢ニ傘狀ヲナシテ

獨活花ニ似タリ根ノ形細長黃白色芬香アリノ

ダケヨリ長クノ又ナシコレ時珍説トコロ色似

斜蒿葉如野菊而細瘦ト云蘇頌ノ説ニ色理黃白

似人參而細短ト云是ナリ一種白花モノノリ武
州平塚邊ニアリ葉莖花實皆ノダケト一般只花
白キノミコレ蘇頌ノ説ニ似芸蒿七月内開白花
與蔥花相類ト云コレナリ其ノダケト云ハ處々
山中ニ多シ初生ノ葉ハ三葉三ツバゼリノ如ク
莖紅紫色ニ三年ヲ經ルモノ葉ノ形獨活ニ似テ
頗小秋月莖高サ三四尺末ニ花傘狀ヲナシテ開
ク形芥花ニ似テ肥大紫黑色實ノ形大麥ノ如堅
ニ條理アリ根黃色美香アリ是蘇頌ノ説ニ色理

白似人參而細短香味都微ト云コレナリ蘭山云
又田舎前胡ト呼モノハ黑色ニシテ下品也又若
州及江州ノ朽木葛川ヨリ出スモノハ堅實ニノ
發味アリ甚下品ナリ凡ソ陳久ナルハ惡シ云云

本草
穿要

前胡 ウダナ 本草
和名 處々山中ニ多シ初生三葉

長スレバ獨活葉ノ如クニナル莖紫高サ三四尺

花ノ形芥ニ似テ大ニ紫黒花ヲ開ク實大麥ノ如

ク條理アリ○一種 カワ前胡 和州 和州ニ産ス

本草 前胡

三三

葉ハ當歸ニ似テ綠色莖高サ二三尺花傘狀ヲナ

シテ白色根細長ニノ又ナク黃白色芬香ナリ蘇

頌ノ説ニ色理黃白似人參而細短シトイフ是ナ

リ本草
圖譜

ミツバグサ 前胡 本綱十二 ○ヤマゼリ 前胡 本綱十二

當歸ト云者上品ナリ 京洛白川山二生ス細葉三
四寸枝多ク花實アリ又 勢州多産ス當歸葉ノ前

胡ト云新根 ○コマゼリ 前胡 本綱十二
ヲ採藥トス 古未世利 延喜式 ○ムマゼリ 前胡 勢州

○ウタナ 前胡 本綱十二 ○ノダケ 前胡 本綱十二
字多奈 腎心方 ○ノダケ 前胡 本綱十二

同上 ○タニゼリ 前胡 本綱十二 ○イワウゼリ 前胡 本綱十二
○タニゼリ 前胡 本綱十二

十二

本草藥名備

考和訓鈔

前胡

綱目

西天蔓

輟耕錄

知香萊

鄉藥本草

コマゼリ

延喜式

ノゼリ同上

谷ゼリ

ミツバクサ

山ニ

多シ實バヘノ時ハ三葉ニシテ長ズレバ莖ニ葉

互生ス枝葉トモニ羌活ナドニ類ス秋ニイタリ

テ莖ノ長サ四五尺餘ニモ長シ枝端ニ花ヲツク

胡蘿蔔ノ花ノゴトク小白花ヲ簇生ス又紫黑色

ノ花咲モアリ又一種細葉ノモノアリ枝數多ク

當歸ノ葉ノゴトシ花ハ同シ

四季賞花集

本草

前胡

五

前胡

醫心方云于多奈

藻鹽草作歌萊

本草和名云野芥

藻鹽草云

ヤサリ

俗云野竹此草有三種一曰野芥其

葉柔弱而花白略類蛇牀花一曰野竹稍似前種而

根色灰黝一曰三葉草硬莖曲節每枝三葉花白而

稀疏根皮淡白晉安陳光漢答中山吳繼志書以野

芥爲前胡野竹爲軟苗前胡三葉草爲硬苗前胡從

新云內有硬者名雄前胡須揀去勿用此所謂硬苗

乎今產於近江若狹大和石見上野信濃者蓋所云

軟苗也可取性軟而實味甘氣香者冬採者更良枯

飄者齊于塵芥

本草綱目纂疏

增實生ヨリ三年ヲ經テ花實ヲ生ズ故ニ藥用ニ

ハ二年目ノ秋掘リ採ルベシ三年ヲ經レバ輕虛

ニシテ佳ナラズ 本草原始李仲立曰比柴胡先

生故名前胡 阿州德島箱田大夫ノ醫師牧野春

德ト云者生涯前胡ヲ用テ柴胡ヲ用ヒズコレ外

臺秘要ノ大前胡湯小前胡湯ニ據ルナリソノ病

ヲ治スルヲ柴胡ヲ用ユル者ニ劣ラズ記ノ以テ

參攷ニ備フ 古渡リニ前胡手ノ羌活ト云モノ

真ノ獨活ナリト云傳フル由獨活ノ條ニ辨スレ

凡ソノ形狀氣味ヲ詳ニスルニ全ク和産ノ前胡

ニ異ナルヲナシ惟輕虚枯燥スルノミ獨活ニハ

アラズ
重修本草
綱目啓蒙

ゼンゴ
通名　メンザイラク
濃州苗水　前胡
物品識名

前胡根
時珍曰其根皮黑肉白有香氣爲真
大抵北地者爲勝故方書称北前胡舶來

ノモノ希ナリ且陳舊ニノ用ルニタヘズ　和産

多シ藥舗ニ大和ヨリ出ルモノ良ナリ
イナカ四舍ト呼

モノハ氣味差劣レリ次トス
日用藥
品考

前胡

ノダケ

ミツバグサ

延喜式

今ハ通名

山中自生多シ苗三葉ナル故ニ古名ミツバグサ

ト云長ルニ随ヒ岐ヲ分チ莖ヲ抽キ高サ七八尺

葉互生ス形獨活シクワド葉ニ類ス秋ニ至リ枝端ニ花ヲ

開ク胡蘿蔔花ノ如ク傘ヲ成シ紫黑色ナリ又白

花者モアリ一種細葉者アリ葉形當歸葉ニ似テ

花モ亦異ナラズ

救荒本草啓蒙

前胡

金胡

西天蔓

一種細葉ノ前胡ト云ア

リ和州ニ多シ唐ノ前胡モ此類ナルカ又田舎前

胡ト云アリ黒色ニノ下品ナリ又江州ノ邊ヨリ

出ルアリ堅實ニノ莢味アリ甚下品ナリ

手板
發蒙

苦荬菜

前胡一種
ミツバグサ

生原野苗高二三尺秋開

此

一種俗名苦荬菜蔽地生山坑處其性極涼惟外科


用餘無他見

壬寅陳文錦李質問
興成盧亨春

本草

本草通串卷四十三

本草通串卷四十四



富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

防風

防風味甘溫主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見
風行周身骨節疼痛煩滿久服輕身一名銅芸

神農本草經

○大觀
本草

本草經曰防風一名銅芸甘溫治大風頭眩痛目盲
無所見煩滿風行周身骨節疼痛久服輕身
神農本草經○太
平御覽

防風
本品經
釋名銅芸
本品經
主治大風頭眩痛惡風風邪

目盲無所見風行周身骨節疼痛久服輕身
神農本草經
○本草綱目

本草云主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行
周身骨節疼痺煩滿
神農本草經
○湯液本草

防風味甘溫主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見

風行周身骨節疼痺煩滿久服輕身

銅芸

神農本草經○盧

復手錄

防風味甘温主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見

風行周身骨節疼痛煩滿

神農本草經疏○吳懷祖輯要

防風味甘温主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見

風行周身骨節疼痛煩滿久服輕身

神農本草經○百種錄

防風味辛無毒主煩滿脇痛脅風頭面去來四肢攣

急字乳金瘡內瘕○葉主中風熱汗出一名回草一

名屏風一名蔞根一名百枝生沙苑川澤及邯鄲琅

邳上蔡二月十月採根暴乾名醫別錄大觀本草○

防風釋名回草別錄屏風別錄蔞根別錄百枝別錄集解別錄

曰防風生沙苑川澤及邳瑯琊上蔡二月十月采

根暴乾氣味別錄曰辛無毒主治煩滿脇痛風頭面

去來四肢掣急字乳金瘡內瘻別錄○葉主治中風熱

汗出別名醫別錄○
錄本草綱目

本草云主煩滿脇痛風頭面去來四肢掣急字乳

金瘡內瘻名醫別錄○
湯液本草

墳大防
南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之

涼風西風謂之秦風

爾雅釋天釋地

防隄也从官方聲笱方切



八風也東方曰明庶風

東南曰清明風南方曰景風西南曰涼風西方曰閭

闔風西北曰不周風北方曰廣莫風東北曰融風風

動蟲生故蟲八日而化从虫凡聲凡風之屬皆从風

方戎切



古文風說文

陶隱居云郡縣無名沙苑今第一出彭城蘭陵卽近

琅琊者鬱州百市亦得之次出襄陽義陽縣界亦可

用卽近上蔡者惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者爲

好俗用療風景要道方時用

神農本草陶弘景註○大觀本草

范子計然曰防風出三輔白者善

太平御覽

吳氏本草曰防風一名迴雲一名回草一名百枝一

名簡根一名百韭一名百種神農黃帝岐伯桐君雷

公扁鵲甘無毒李氏小寒或生邯鄲上蔡正月生葉

圓青黑黃白五月黃花六月實黑二月十月採根日

乾琅瑯者良

吳普本草○太平御覽

釋名

回芸

吳普

百韭

吳普

集解

普曰

正月生

葉細

圓青

黑

黃白五月黃花六月結實黑色

氣味

普曰

神農

黃帝

岐伯桐君雷公扁鵲甘無毒李當之小寒
○吳普本草
○本草綱目

弘景曰郡縣無名沙苑今第一出彭城蘭陵卽近琅
琊者鬱州百市亦有之次襄州義陽縣界亦可用惟
以實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者爲好
神農本草陶
弘景註○本
目草綱

境大防註謂隄○南風謂之凱風註詩曰凱風自南

○東風謂之谷風註詩曰習習谷風○北風謂之涼

風註詩云北風其涼○西風謂之泰風註詩云泰風

有墜爾雅郭

璞註

太原晉陽以北生屏風草博物志

彙考增博物志太原晉陽以北生屏風草廣群芳譜

得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石與餘糧療婦

人子藏風殺附子毒惡乾姜藜蘆白欬芫花藥對○大觀本

草

氣味之才曰得葱白能行周身得澤瀉藁本療風得

當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子藏風良薑藜蘆殺

附子毒惡藜蘆白欬乾薑芫花藥對○本草綱目

本草又云得澤瀉藥水療風得當歸芍藥陽起石禹
餘糧療婦人子藏風殺附子毒惡乾姜藜蘆白欬芫
花藥對○湯
液本草

藥性論云防風臣花主心腹痛四肢拘急行履不得
經脉虛羸主骨節間疼痛藥性論○
大觀本草

花主治四肢拘急行履不得經脉虛羸骨節間痛心

腹痛甄藥性論○
權本草綱目

防風味甘辛溫無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲
無所見風行周身骨節疼痺煩滿脇痛脇風頭面去

來四肢寧急字乳金瘡內瘕久服輕身葉主中風熱
汗出一名銅芸一名苗草一名百枝一名屏風一名
蔞根一名百悲生沙苑川澤及邯鄲琅瑯上蔡二月
十月採根暴乾千金翼方

附方解烏頭毒

附子天雄毒並用防風煎汁飲之解

芫花毒解野茵

每千金方○
本草綱目

青州防風子可亂華撥

酉陽雜俎

彙考增

酉陽雜俎

香州防風子可亂畢撥

廣群芳譜

唐本注云今出齊州龍山最善淄州兗州青州者亦

佳葉似牡蒿附子苗等別錄云叉頭者令人發狂叉
尾者發痼疾子似胡荽而大調食用之香而療風更
優也沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶
云無沙苑誤矣襄陽義陽上蔡元無防風陶妄註尔
唐本注○
大觀本草

集解恭曰今出齊州龍山最善淄州兗州青州者亦

佳葉似牡蒿附子苗等沙苑在同州南亦出防風輕
虛不如東道者陶云無沙苑誤矣

子主治療風更

優調食之

蘇唐本注○
恭本草綱目

波萬近可奈 味少苦 久香之 无毒 八九月採根 乎

陰乾 尔大 寸聚方 同類

防風 一名銅芸 一名曰草 一名百枝 一名屏風 一名

蔞根 仁諧 音管 一名百蜚 仁諧 音倍 揚 一名連草 一名蔞

芸 已上出 一名同雲 一名百種 已上出 一名夏友 出

兼名苑 和名波末湏加奈 一名波末尔加奈 本草 和名

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似牡蒿白花八月九

月採根藥性論云防風臣花主心腹痛四肢拘急行

履不得經脉虛羸主骨節間疼痛段成式酉陽雜俎

云青州防風子可亂華搔

蜀本草掌禹錫按○大觀本草

防隄也從阜方聲臣鍇按春秋左氏傳塹防門而守

之浮長反

八

風也東方曰明庶風東南曰清明風

南方曰景風西南曰涼風西方曰閭闔風西北曰不

周風北風曰廣莫風東北曰融風風動蟲生故蟲八

日而化從虫凡聲凡風之屬皆從風方戎切

風

古文

風

說文解字通釋

伊豆國十八種

防風十五斤

○相摸國卅二種

防風三斤○上野國十五種

防風六十斤

延喜式

防風 兼名苑云防風一名屏風和名波萬須加奈

一云波萬仁加奈 和名類聚方

日華子云治三十六般風男子一切勞劣補中益神

風赤眼止淚及癰瘰通利五藏開脉五勞七傷羸損

盜汗心煩體重能安神定志勾氣脉實 日華本草大觀本草 ○

主治治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤

眼止冷淚及癰瘰通利五藏開脉五勞七傷羸損盜

汗心煩體重能安神定志勾氣脉 大日華子大明本草綱目

圖經曰防風生沙苑川澤及邯鄲上蔡今京東淮浙

州郡皆有之根土黃色與蜀葵根相類莖葉俱青綠色莖深而葉重似青蒿而短小初時嫩紫作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似蒔蘿花實似胡荽而大二月十月採根暴乾闕中生者三月六月採然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月採根暴乾亦療頭風眩痛又宋毫間及江東出一種防風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然云動風氣本經云葉主中風熱汗出與此相反恐別是

一種耳
觀本草
大

集解 頌曰今汴東淮淝州郡皆有之莖葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿而短小春初時嫩紫紅色江東宋毫人永作茱萸極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似蒟蒻花實似胡荽子而大根土黃色與蜀葵根相類二月十月永之開中生者三月六月永之然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月永根暴乾亦療頭風脹痛葉

主治 頌曰江東一種防風茹其嫩苗云

動風與此文相反豈別是一物耶

蘇頌園經本草綱目

齊州防風 解州防風 同州防風 河中府石防

風 備急本草圖按

防風黃耆世多相須而用唐許嗣

嗣本羊晉切犯廟諱今改爲嗣宗

爲新蔡王外兵參軍王太后病風不能言脈沉難對

醫告術窮嗣宗曰餌液不可進卽以黃耆防風煮湯

數十斛置床下氣如霧熏薄之是夕語

本草行義丹波元胤訂

正重雕宋本

防風曰銅芸曰苗草曰百枝曰屏風曰蔞根曰百蜚

葉如青蒿嫩苗可茹

昆蟲草木略

墳大防疏李巡曰墳謂崖岸狀如墳墓名大防也詩

周南云遵彼汝墳又釋地云墳莫大於河墳是也△

南風謂之凱風云云疏一南風謂之凱風者李巡曰

南風長養萬物喜樂故曰凱風凱樂也郭氏無說義

或當然詩邛風云凱風自南是也一東風謂之谷風

者孫炎曰谷之言穀穀生也谷風者生長之風也詩

邛風云習習谷風是也一北風謂之涼風者北風一

名涼風言北方寒涼之風也月令孟秋之月涼風至

詩邶風云北風其涼是也一西風謂之泰風者孫炎

曰西風成物物豐泰也詩大雅桑柔云泰風有隧是

也爾雅邢
曷疏

珍云身去身半已上風邪梢去身半已下風邪

張元
素珍

珠囊。湯
液本草

氣味 元素曰味辛而甘氣溫氣味俱薄浮而升陽也

手足太陽經之本藥 **主治** 治上焦風邪瀉肺實散頭

目中滯氣經絡中留濕主上部見血元發明元素曰

防風治風通用身半已上風邪用身身半已下風邪

用稍治風去濕之仙藥也風能勝濕故爾能瀉肺實

誤服瀉人上焦元氣

張元素○
本草綱目

象云治風通用瀉肺實散頭目中滯氣除上焦風邪

之仙藥也誤服瀉人上焦元氣去蘆并釵股用心云

又去濕之仙藥也風能勝濕爾東垣云防風能制黃

芪黃芪得防風其功愈大又云防風乃卒伍卑賤

之職隨所引而至乃風藥中潤劑也雖與黃芪相制

乃相畏而相使者也

李東垣藥類法
象○湯液本草

氣味泉曰防風能制黃芪黃芪得防風其功愈大乃

相畏而相使者也發明果曰防風治一身盡痛乃卒

伍卑賤之職隨所引而至乃風藥中潤劑也若補脾

胃非此引用不能行凡脊痛項強不可回顧腰似折

項似拔者乃手足太陽證正當用防風凡瘡在胸膈

已上雖無手足太陽證亦當用之爲能散結去上部

風病人身體拘倦者風也諸瘡見此證亦須用之錢

仲陽瀉黃散中倍用防風者乃於土中瀉水也○李杲

草綱目

防風

臣惡乾薑藜蘆白
斂荒花制附子毒味甘辛性溫無毒升也陽也

其用有二以氣味能瀉肺金以體用通療諸風防風

主治一切風仍觸痛腦防風味甘辛溫無毒能觸附

子毒明目止汗療崩○嗽有聲無痰者用生薑杏仁

防風○咳有聲有痰者用半夏枳殼防風○上部見

血用防風○解利傷風須用防風爲君白朮甘草爲

佐○解利傷寒甘草爲君防風白朮爲佐○凡諸風須

用防風天麻○防風祛風

李杲藥性賦

防風純陽性溫味甘辛無毒足陽明胃經足太陰脾

經乃二經之行經藥太陽經本經藥

湯液本草

氣味 好 古曰 又行足陽明太陰二經爲肝經氣分藥

主治 搜肝氣 好 王好古 本草綱目

曲方氏

防風 錄 輟耕

防風

治男子一切勞劣補中益氣 偏正頭風用防風白芷等分爲末蜜丸彈子大每朝一丸茶下

葉似青蒿而矮根與蜀葵相類種法與種菜同五月

開細白花花心攢聚如薔蘿子如胡荽苗可食爽口

去風

致富 全書

防風 一名銅芸 一名苗草 一名百枝 一名屏風 一

名蔞根 一名百蜚生 同州沙苑川澤邯鄲琅瑯上蔡

陝西山東處處皆有今中年田野中亦有之根土黃色與蜀葵根相類稍細短莖葉俱青綠色莖深而葉淡葉似青蒿葉而闊大又似米蒿葉而稀疏莖似茴香開細白花結實似胡荽子而大味甘辛性溫無毒殺附子毒惡乾薑藜蘆白斂芫花又名石防風亦療頭風眩痛又有叉頭者令人發狂叉尾者療痼疾

救飢 採嫩苗葉作菜茹燂熟極爽口

救荒本草
農政全書

防風一名銅芸一名苗草一名百枝一名屏風一名
蔞根一名百蜚生同州沙苑川澤邯鄲琅瑯上蔡陝

西山東處處皆有今中牟田野中有之根土黃色與
蜀葵相類稍細短莖葉俱青綠色莖深而葉淡葉似
青蒿葉濶大又似米蒿葉而稀疎華似茴香開細花
白色結實似胡荽子而濶大味甘性辛溫無毒殺附
子毒惡乾姜藜蘆白斂芫花又有石防風亦療頭風
眩痛又有叉頭者令人發狂叉尾者發痼疾救飢採
嫩苗葉作菜茹燂熟可食極爽口

治病

具見古今本草醫統

防風味甘辛氣溫升也陽也無毒種生沙苑屬河南根

類蜀葵秋後採收曝乾入藥殺烏頭大毒惡藜斂芫

蔓藜蘆白斂擇堅實脂潤爲良去蘆頭釵股不用係
 荒花乾蔓

太陽本經之藥又通行脾胃二經職居卒伍卑賤之
 流聽命卽行隨引竟至盡治一身之痛而爲風藥中
 之潤劑也治風通用散濕亦宜身去身半以上風邪
 稍去身半以下風疾收滯氣面頰尤瀉肺實有餘歐
 眩暈頭顱更開目盲無見故云上焦風邪要藥儻或
 誤服反瀉人上焦元氣爲害豈淺淺哉花止痛骨節
 間亦治風効子消穀胃脘內又調食香葉收採煎湯

主風熱汗出

本草
 蒙荃

防風味辛甘性溫無毒入肺經瀉肺金療諸風閉結
氣理目痛惡乾薑藜蘆白薇芫花解附子毒 按防
風辛走肺屬升陽之劑故通療諸風氣之結者肺之
疾也目之痛者風之患也宜竝主之東垣云卑賤之
卒聽令而行隨所引而至乃風藥中閔 也治瀉上
焦元氣虛者不得繫用今人類犯此弊

鵠補雷公炮製藥性解

釋名時珍曰防者禦也其功療風最要故名屏風者
防風隱語也曰芸曰苗曰藺者其花如苗香其氣如
芸蒿藺藺也**集解**時珍曰江淮所產多是石防風生

于山石之間二月采嫩苗作菜辛甘而香呼爲珊瑚

菜其根粗醜其子亦可種吳綬云凡使以黃色而潤

者爲佳白者多沙條不堪氣味甘溫無毒

本草綱目

防風味辛甘氣溫無毒氣味俱薄浮而升陽也手足

太陽二經水藥又行足陽明太陰二經爲肝經氣分

藥也李時珍曰防者禦也其功禦風最捷故名曰芸

也今出彭城蘭陵琅邪鬱川百市者佳○蘇氏言出

齊州龍山最善淄州兗州青州者亦佳二月生芽紅

紫色作茹柔嫩爽口三月莖葉轉青莖深葉淡似青
蒿而短小五月開花似蒔蘿花細小而白攢簇作房
似胡荽子而稍大九月採根似葵根而黃色又江淮
間一種石防風生山石間二月採嫩苗作茹辛甘而

香呼爲珊瑚菜長大葉青花白其根粗醜似蒿根其子亦可種修治去又頭又尾及枯黑者又頭食之令人發狂又尾令人發痼疾○又關中生者三月六月採之然輕虛不及齊州者良以療頭風脹痛如神

○防風散風寒濕痺之藥也故主諸風週身不遂骨節痠疼四肢攣急痿痺痙瘓等證又傷寒初病太陽經頭痛發熱身疼無汗或傷風咳嗽鼻塞咽乾或瘧瘡將出根點未透用防風辛溫輕散潤澤不燥能發邪從毛竅出故外科癰瘍腫毒瘡瘍風癩諸證亦必需也爲卒伍之職隨引而效如無引經之藥亦不能獨奏其功故與芎芷上行治頭目之風與羌獨下行

治腰膝之風與當歸治血風與白朮治脾風與蘇麻
治寒風與芩連治熱風與荊栢治腸風與乳桂治痛
風及大人中風小兒驚風防風蠶能去之若入大風
厲風藥中須加殺蟲活血藥乃可云

本草
景言

防風一名屏風東京者佳身去身半已上風邪稍去

身半已下風邪廼治諸風要藥因名防風

東防風粗
大條直土

黃色溫潤切片有金井玉欄可愛此品

本草
原始

防風一名屏風一名同芸一名回草一名銅芸一名

商根一名百枝一名百蜚出齊州龍山最善淄青兗

者亦佳今汴東淮浙皆有莖葉青綠色莖深而葉淡
似青蒿而短小春初嫩時紫赤色五月開細白花中
心攢聚作大房似薔蘿花實似胡荽子而尖根土黃
色與蜀葵根相類二月十月永開中者三月六月永
然輕虛不及齊州者良氣溫味辛而甘治三十六種
風男子一切勞劣補中益神通利五臟心煩體重羸
瘦盜汗散頭目中滯氣經絡中留滯得蔥白能行周
身得澤瀉薰本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療
婦人子臟風○製用 二月永嫩苗作茶辛甘而香呼
爲珊瑚菜極爽口其根粗醜子

亦可種入藥以黃色脂潤頭節堅如蚯蚓頭者爲
 好白者多沙條不堪禁忌又頭者令人發狂又尾
 者發人群芳
 瘡疾譜

防風味甘辛氣溫升也陽也無毒係太陽本經之藥
 又通行脾胃二經古人曾分上中下以療病其實治
 風乃一葢隨所用而聽令從各引經之藥無所不達
 治一身之痛療半身之風散上下之溫祛陰陽之火
 皆能取效但散而不收攻而不補可暫時少用以成
 功而不可經年頻用以助虛○或問通聖散專特防
 風以散風邪可常用乎曰此方暫服尚不可焉可常

用哉蓋防風散人真氣卽以之散風邪又未可專特也○或問防風得黃芪乃不散邪而補正是防風又可補之物先生何謂攻而不補乎夫黃芪得防風而其功更大未聞防風得黃芪而其功更神然乃防風仍是攻而不補非攻而又補之物也○近人皆以防風爲散風神藥毋論外感與非外感俱用之乃服而不效或疑所用之不多也更加分兩以致散盡真氣不可哂乎殊不知防風宜于無風之所同黃芪用之可以杜風邪令不入于皮毛非風邪已入而可用之

物也古人名物必有深意顧名而可悟矣

本草新編

防風 銅芸 百枝 屏風 曲方氏 苗草 百

蜚

荷根事物異名

野菜 ○防風茅 王西樓萊譜詳矣

物理小識

防風 𠔁𠔁 𠔁𠔁 𠔁𠔁 性溫味甘辛無毒治三十六

般風通利五藏開脉風頭眩痛風赤眼出淚周身骨

節疼痛上盜汗安神定志 ○生山野中隨處有之二

月十月採根暴乾惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者

爲好去蘆及叉頭叉尾者叉頭令人發狂叉尾發瘡

疾本草○足陽明足太陰之行經藥也足太陽本經藥

也治風通用身去身半以上風邪梢去身半以下風

邪湯液○除上焦風邪之仙藥也入門葉主中風熱汗出

草花主心腹痛四肢拘急經脉虛羸本草子似胡荽而

大調食用之香而療風更優也本草東醫寶鑑

防風 辛甘微溫升浮爲陽搜肝瀉肺散頭目滯氣

經絡留濕主上卽見血用之爲使亦能治崩上焦風邪頭痛目

眩脊痛項強周身盡痛太陽經症勝眩徐之才曰得蔥白能行周身

又行脾胃二經爲去風勝濕之要藥凡風藥皆能勝濕東垣曰卒伍

卑賤之職隨所引而至乃風藥中散目赤瘡瘍若血
潤劑若補脾胃非此引用不能行

虛痙急頭痛不因風寒頭痛泄瀉不因寒濕火升發

嗽陰虛盜汗陽虛自汗者並禁用同黃耆芍藥又能

白朮名玉屏風散固表聖藥黃耆得黃潤者良上部

防風而功益大取其相畏而相使也

用身下部用稍畏華薤惡乾薑白斂芫花殺附子毒

增訂本草
草備要

防風稟天地之陽氣氣厚味薄升也陽也手足太陽

經本藥又爲足少陽厥陰經氣分之風藥同黃耆

芍藥則實表止汗同甘草桔梗紫蘇桑白皮杏仁

橘皮解利傷風去紫蘇換薄荷加石膏兼除風熱

得蔥白能行周身 頭痛因於血虛不因於風寒溼

泄不因於寒溼小兒脾虛發搐慢驚慢脾風氣升作

嘔火升發嗽陰虛盜汗陽虛自汗等病法所同忌

本草

經疏
輯要

防風味甘溫主大風頭眩痛惡風風邪

風病無目盲不治也

無所見

風在上竅也

風行周身

風在偏體也

骨節疼痛

風在筋骨也

煩滿

風在上焦也

久服輕身

風氣除則有此效

凡藥之質輕而氣

盛者皆屬風藥以風卽天地之氣也但風之中人各

有經絡而藥之受氣于天地亦各有專能故所治各
 不同于形質氣味細察而詳分之必有一定之理也

○防風治周身之風乃風藥之統領也

神農本草
經百種錄

防敷𠂔切音房說文隄也又禦也禁也備也本作防
 三画篆作𠂔說文或从土作陞篆作𠂔按防必加土
 隄陴陵阿隄隄等字凡土屬者皆當如防之从土六
 書無此例說文贅古通作坊禮坊記坊防同舊注又
 音望引易象叶水在火上引索隱叶諉相竝非風敷
 雍切音封大塊噫氣也釋名風汜也氣溥汜而動物

也○說文風動蟲生故蟲八日而化从虫凡聲篆作
𩊔趙古則曰凡物露風則生蟲故風从虫凡諧聲一
說風在有無之間無所取象虫非義凡非聲趙說曲
附說文泥總要風篆作𩊔从凵云气指事兼意舊譌
作𩊔小篆从几虫作風義缺古文奇字篆作𩊔古風
字从凡聲从星凡古蓬字編韋張之以使風行舟星
有好風有好雨察星月相從以知風期也按此說改
从星亦泥周禮作觀韻會古作風碧落文作𩊔𩊔
別作𩊔𩊔今皆不從正韻收觀失考正風風之譌風

从天气形从日中出气成風篆作𩊔舊本作風俗以

風為古文風並非正字通

曲方氏清異錄候寧極藥譜曲方氏防風也 珊

瑚菜本草綱目石防風生於山石之間作菜辛甘

而香呼為珊瑚菜事物異名錄

防唐濁符方切音房隄也禦也禁也備也風東清方

中切音鋒大塊之噫氣王者之聲教也景字

原防風一名屏風一名同芸一名同草一名銅芸一

名簡根一名百枝一名百蜚本草綱目云防者禦也其功療風最要故名屏

風者防風隱語也曰芸曰蔞曰蔞者出齊州龍山最其花如蔞香其氣如芸蔞蔞蘭也

善溜青宛者亦佳今汴東淮浙皆有之莖葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿而短小春初嫩時紫紅色采作茱茹極爽口五月間細白花中心攢聚作大房似蒔蘿花實似胡荽子而大根土黃色與蜀葵根相類二月十月采關中生者三月六月采然輕虛不及齊州者良氣溫味辛而甘治三十六種風男子一切勞劣補中益神通利五臟心煩體重羸瘦盜汗散頭目中滯氣經絡中留濕得蔥白能行週身又有石防風

出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月

采根曝乾亦療頭風彙考增博物志太原晉陽以北

生屏風草

酉陽雜俎香州防風子可亂畢撥

原

金鑾密記白居易在翰林賜防風粥一甌剔取防風

得五合餘食之口香七日

別錄原製用江淮所產

多是石防風生于山石之間二月采嫩苗作菜辛甘而香呼爲珊瑚菜其根麁醜子亦可種入藥以黃

色脂潤頭節堅如蚯蚓頭者爲好白者多沙條不堪

用

禁忌

又頭者令人發狂又尾者發人痢疾

廣群芳譜

蔬之屬

防風

根如小蘿
萄可醃食
琉球國志略

藥物

防風二百三斤

兗州府

○防風五十五斤

東昌府

○

防風二百四斤

青州府

○防風六十九斤

登州府

○防風

八十斤

萊州山東府通志

藥之屬

防風

山花菜

重修鎮江府志

藥品

防風

根類蜀葵根土黃色能禦風邪

通志

防

唐韻

集韻

韻會

正韻

拉扶方切

音房

說文

隄也

玉

篇

郵也

廣韻

防禦也

爾雅

釋地

墳大防

疏墳

謂厓岸

狀如墳墓名大防也

風

古文

風

風

風

風

風

風

風

方戎

切集韻方馮切正韻方中切並音楓風以動萬物也

河圖風者天地之使元命包陰陽怒而為風康熙字典

防風和名波末於保惠異名銅芸本經別錄屏風別錄增補異

名同芸吳普同草別錄蔞根別錄百枝別錄百蜚吳普編識

防風 八夕力十草藻鹽

防風一名銅芸神農本草一名蔞草名醫別錄一名百枝同上

名屏風同上一名蔞根同上一名百蜚同上一名珊瑚菜本草

綱目一名山花菜重修鎮俗名也理尼摩施摩近江州

又名也理圻里同上又名客華賴尼摩施摩州伊勢

防風陶隱居云郡縣無名沙苑今第一出彭城南陵
卽近琅邪者鬱州互市亦得之次出襄陽義陽縣界
亦可用卽近上蔡者惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭
者爲好俗用療風最要道方時用唐本注云今出齊
州龍山最善淄州兗州青州者亦佳葉似牡蒿附子
苗等別錄云又頭者令人發狂又尾者發痼疾子似
胡荽而大調食用之香而療風更優也沙苑在同州
南亦出防風輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣襄
陽義陽上蔡元無防風陶乃妄注爾臣禹錫等謹按

蜀本圖經云葉似牡蒿白花八月九月採根

嘉祐補注本草

防風生沙苑川澤及邯鄲上蔡今京東淮浙州郡

皆有之根土黃色與蜀葵相類莖葉俱青綠色莖渾
而葉波似青蒿而短小初時嫩紫作萊茹極爽口五
月開細白花中心攢聚作大房似蒔蘿花實似胡荽
而大二月十月採根暴乾關中生者三月六月採然
輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿
根而黃葉青花白五月開花六月採根暴乾亦療頭
風眩痛又宋亳間及江東出一種防風其苗初春便

生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然云動風氣
水經云葉主中風熱汗出與此相反恐別是一種耳
本草 防風 江淮所產多是石防風生于山石之間
圖經

二月采嫩苗作菜辛甘而香呼爲珊瑚菜其根粗醜
其子亦可種吳綬云凡使以黃色而潤者爲佳白者
多沙條不堪

明李時珍
本草綱目

防風一名銅芸一名蔞草

一名百枝一名屏風一名蔞根一名百蜚生同州沙
苑川澤邠鄆琅邪上蔡陝西山東處處皆有今中牟
田野中亦有之根土黃色與蜀葵相類稍細短莖葉

俱青綠色莖深而葉淡葉似青蒿葉而闊大又似米
蒿葉而稀疎莖似茴香開細白花結實似胡荽子而
大味甘辛性溫無毒殺附子毒惡乾姜蘘蘆白斂芫
花又名石防風亦療頭風眩痛又有又頭者令人發
狂又尾者發痼疾救飢採嫩苗葉作菜茹燂熟極爽

口明徐光啓
農政全書

大原晉陽以北生屏風草

晉張華
博物志

青州防風子可亂畢撥唐段成式酉
陽雜俎續集

雞頭一斗用

防風四兩換水浸之久久益佳他果煮以防風水浸
之經月不壞陳彥和每用之至和初京師大疫大醫

進方有用犀角內出二株解之其一通天犀也內侍

御舜舉靖請以爲御所服帶上曰豈急於服御而不

以療民立命碎之鐵銀硃金銀百十年不壞以推阜

角則一夕碎破輟以蓄焉愈久愈潤以擊杖隨卽折

裂

宋劉跂
暇日記

防風苗色紅如燕脂可作茹

宋陸遊劍
南詩藁

山花菜生巖石間紅瑩可愛味辛爽口或云卽防

風苗

重修鎮
江府志

防風一名茴草根黃莖葉俱青綠色

類青蒿差短小

江陰
縣志

防風葉似青蒿而矮根與蜀

葵相類種法與種菜同五月開細白花心攢聚如繖

羅子如胡荽苗可食爽口去風清石巖逸叟增廢物定致富奇書類纂

防風甘辛溫水洗去蘆以黃色而潤者為佳又頭者

發狂又尾者發痼疾禁之畏葶藶殺附子毒惡藜蘆

白斂乾薑芫花○市中有筆防風入藥宜用之又有

削防風多濱防風俱非是真防風葉微似水蘄與此二

種大別也削防風即防葵根也濱防風亦防葵類見

食物傳信中本草喉襟

防風 倭防風ト稱スル者數品アリ其中二筆防

風ト云ヲ用ユベシ其餘不可用若水云削防風ハ

葉似牡丹色淺綠俗ニ牡丹人參ト云其根大ナリ
故^ニ劑^テ之而售之又水防風ト云嫩小時爲^ナ菜莖青有^ル
香者是防葵也非防風^ニ世俗以爲人參售之甚非也
○シヤク菜アリイトクリアリ濱防風アリ是皆
防風ノ類ナルベシ和品濱防風 葉ハ防風ニ似
テ莖紫ナリ海濱沙地ニ生ス圃ニウエテモ茂ル
芳潔ニシテ味辛甘クノ美シニ三月ニトル無毒
和品シヤク菜 防風ノ類ナリ可^下爲^ニ菜蔬^ト而食味^上
佳莖長大一枝三葉其一葉亦各有三葉而有岐味

甘美氣香冬不凋葉ノ周有三刻三年ニノ枯ル實
ヲマケバ逐年生ス是石防風ナル乎本草防風ノ
集解二時珍云石防風生于山石間二月采嫩苗作
菜辛甘而香呼爲珊瑚菜其根粗惡其子亦可種○
凡去年菜類ヲ栽タル地ニ今年又同品ヲ栽ルヲ
中華ニハ底ト云倭俗ニイヤ地ト云一切ノ夏ノ
菜皆イヤ地ニ今年又栽レハ不榮壺盧茄南瓜菜
瓜豇豆刀豆等皆然リ冬ノ菜ハ不忌底夏ノ菜類
ハ地ヲ力ヘ或ハ土ヲ力ヘテ可栽舊地ニ不可栽

菊ナド花草モ亦忌底ヲ秋冬ウヘテ夏開花モハ

不忌底ヲ 大和本草

防風 同草 同芸 並同ニ其苗曰珊瑚菜和爾雅

防風 銅芸 回芸 簡根 百枝 屏風 回草

百蜚 和名 波萬須加 又云波萬加奈 本

綱防風其莖葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿而短

小春初嫩時紫紅色作茱茹五月開細白花中心攢

聚作大房似蒔蘿花實似胡荽子而大根土黃色與

蜀葵根相類 石防風 一名珊瑚菜 生山石之間二月

永嫩苗作菜辛甘而香五月開白花根如蒿根而黃

粗醜

此乃防風之一種也

氣味

甘溫氣味俱薄

浮而升陽也手足太

陽經之本藥治風通用身半已上風邪用身身半已

下風邪用梢治風去濕之仙藥也風能勝濕故爾又

云防風治一身盡痛乃卑賤之職隨所引而至乃風

藥中潤劑也若補脾胃非此引用不能行 防風能

制黃芪黃芪得防風其功愈大乃相畏而相使者也

得蔥白能行周身

得澤瀉蕞本療風

凡使以

黃色而潤者爲佳白者不佳又頭者令人發狂又尾

者發人痼疾

惡藜蘆白畏卑薺殺附子毒

△按防風初生

葉形類老苳葉而淡綠一莖二三葉其莖赤紫相抱

生稍長莖圓尖有鋸齒而深青色其嫩時和酢ミソ未醬

茹之極爽口五月開花結子其花實如上說其根入

藥有剗防風濱防風二種

猶唐之東防風石防風之二種

濱防風

者細而微黃色爲勝雲州勢州若州最佳日向因播

次之遠州參州海濱沙地甚多有

濱防風之名由之乎

剗防

風者太而白色爲次豫州之產爲上日向及五島之

產次之

倭漢三才圖會

防風 類草何種モアリイヅレモ宿根ヨリ春出

ル葉形コハカニ切込ミアルヲ筆ボウフウドイ

ヒ葉ノ切込アラクトシテケマン草ノ葉ノゴト

クナルハ尖防風トイフヨシ又葉ノ切込少アリ

莖ムラサキ色ナル有リ濱防風トイフトナリイ

ヅレモ花夏末秋マデサク白シ種モオホク付ク

トリ置テ二月蒔花壇ニ植テナガメアリ

廣益地
錦抄

防風 和名 無シ 本邦ニ本ト有ル事ナシ近

來朝鮮ヨリ來ル其葉ハ防葵ニ似テ細長三年ヲ

經テ高サ二三尺此花モヨク前胡ニ相同ジ子モ
似テ少シ圓ニアリ根ハ長ク直ニシテ牛旁ノ如
シ莖頭ニ毛アリ故ニ筆防風ト呼ブ上品ナリ本
草

繪花蒔

防風 釋名時珍曰防禦也其功療風最要故名修治

堅實而潤者佳去蘆及又頭又尾者洗土氣剉焙用
按防風和與中華產形不同和稱濱防風者根形與
中華產雖微相類葉形不同又稱筆防風者中華產
似筆而蘆頭有毛甚輕虛也與和者來所用者最別

也宜辨之然古來所用之防風用之可也氣味辛甘

無毒能入肺經瀉肺散風赤眼冷淚通利關節頭眩

頭面遊風乃風藥中潤劑也爲去風去濕之仙藥殺

附子毒毒畏革薺惡藜蘆白斂乾姜芫花又頭者令

人發狂又尾者發人痼疾肺虛者勿服之修治本書

ハ防風ノ産ヲシカト知ラヌト見ヘタリ今藥肆

ニ賣ル和ノ防風ト云モノ種々アリ濱防風五島

防風薩摩防風ナド、云アリ皆偽物ナリ不可用

日本ノ老醫今デモ皆此ヲ用ユ相應ニ效アリ真

ノ防風ノ能ニ類スルモノニテアルベシ小便ヲ
利スル能アリ真ノ防風ニハ此能ハナシ真ノ防
風ハ唐ヨリ來ル筆防風ト云モノナリ此ヲ用ベ
シ和ニモ澤山ニ生ズルモノナレドモ日本人取
覺ズ賣藥ニナシセリノ葉ニ似タルモノナリ巽
齋云享保年中唐山ヨリ種子ヲ來ス真物ナリ和
州宇陀ニテ栽ルモノ稀ニ藥舗ニ出ヅ上品也又
和産一種江州伊吹山ニ産ス山人參ト云モノニ
アツ未詳

能此藥ノ主治諸本草ノ面大要同ジ

一ナリ必竟風ヲ去リ濕ヲ除ク是故ノ藥也其内
 ニ上部頭面へ上ル藥也頭ナドノハル、ニハ鬼
 角ノガレ又藥也此分ハ隨分功ノアル藥ニテ此
 外ニアマリツカフハ三へズ東垣ノ脾胃ヲ補
 フニハ此藥デナケレバ引經ガナラヌトテ東垣
 ノ方ニハ多ク此藥ヲ使フテアルナリ何^レ氏會得
 難^レ爲ナリ又泄瀉ノ症ニ風藥デ升提スルトテ往
 往用井ラレタレ^レ此モ濕瀉ヲ目アテニスルト
 見ユルアナガチ升提ノ意得トハ三へズ新編ニ

防風ハ風ヲ引又先キニ用ユル藥引テノ後ハ不
用藥ト云此ハ防風ト云文字ニ拘リテ以ノ外ノ
誤也必竟文字セシサクト云モノ也毒本書ノ如
シ兎角風濕ニヨラザルモノニ用ル藥ニテハナ

シ片玉六
八本草

防風試効療骨節疼痛偏頭痛風赤眼四肢攣急脊
痛項強不可回顧撰修凡撰防風以華舶所貨堅實
細長外面赤褐色内面黃赤色多脂潤者爲佳以其
繞蘆頭有長赤毛多攢稍似廢筆坊間呼爲筆防風

此邠近道亦多唯出江州猪吹山者極良葉稍似青
蒿連莖青綠色掘采暴乾與華中所來無異而物新
性味充實更覺優長但不可多得爲恨也近道者葉
稍大莖紫色生沙石之間根又短小力劣疑是蘇頌
所說石防風性味相髣髴可以充闕時之用也用時
水洗剉細又坊間有一種稱水防風者一名削防風
卽是防葵之別種而非防風時醫用之謂有效抑亦
違矣又有海濱防風多生海濱人間采嫩苗食辛甘
芳香可口而亦非防風此二品決不可用辨正名醫

別錄曰又頭者今人發狂又尾者發人痼疾吁亦甚矣唯不可用岐頭岐尾者耳張元素曰身半已上風邪用身身半已下風邪用梢此亦鑿矣

一本堂藥選

防風 和漢共ニアリ但シ和二三種アリ俗ニ山人參ト稱スルモノ是真ナリ卽漢ヨリ來ル筆防風ト一般也可供藥用其他ノ水防風ト云モノアリ一名ケヅリ防風ト云時醫多用之是防葵ノ一種ニノ非防風又濱防風アリ亦防葵ノ一種ナリ共ニ不可用本草原始及救荒本草ニ有圖可考升

本草綱目

二

麻防風一味醫藥ノ常用ニシテ偽品最多シ不可

不辨故詳説及之
防手防風借音ナリ
曲方氏防風須知

防風 筆防風ヲ真トス唐ヨリモ來ル洛ノ白川

山エイ山ナドニ有之防風種ルイ甚多シケヅリ

防風水防風ボタン人參御赦免人參トテ種々ノ

モノアリ防風ノシユルイナリ 會誌云ヤマゼ

リ人參 藥店ニフテ防風ト云真ナリ 蒔蘿花

ハ小苗香ナリ 珊瑚菜ハ防風ノ苗ヲ云ナリ

藥店ノケヅリ防風ト云ハ防葵ナリト云ヘリ卷

防風或ハハマ防風モ防葵ノルイナリ 別本云

渡防風防已ノ一種水防風防已ナリ 釋名ノ蘭根

フジバカマ 集解ノ蒔蘿花ハイノンドロ 胡

葵子ハ コエンドロ 石防風ハ濱防風ナリ水草

會誌

濱防風 武州及丹州宮津攝州尼ヶ崎邊海沙地

往往有之葉摺地生細葉厚軟略似棘米茱葉一處

攢生四散婆娑有茵蔯之態根全如真防風而蘆頭

少毛爲異洛之御藥園亦植之防葵亦名濱防風名

同物異不可誤混本草一家言

防風 ヤマニンジン 四五種アリ此説ハ甚混

雜セリ青蒿葉トハ山ニンジンナリ綱目ニハ短

小トアリコヽニハ闊大トアリ米蒿葉ニ似トア

ルハ濶大ノ説ニアハズ殊ニ稀疎トアリ又結實

山ニンジン胡荽子ニ不似ツ子ノ莢ノニンジン

ニ似タリ防葵ノ實ヨク合セリ然シ此條ノ如キ

モノアリ石防風ハ濱防風ナリ防風ノ説ニ云ベ

シ救荒本草臆斷

屏風

卽^チ防風ナリ近時真ノ防風ト云モノアリ

卽^チ叡山ボウフウコレナリ伊吹山産ハ葉細ニ毛

アリ又中土ノ産アリ近時處々植モノ葉ニ白粉

ヲ帶^ブ伊吹叡山等ノ産トハ大キニ異ナリ三種ト

モ根形竝味異^{コトナシ}此外ボタンニンジント

云モノアリ卽防葵ナリ五島ボウフウト云又珊

瑚菜アリ卽石防風ナリ此二種ハ似タリト雖モ

ボウフウニハアラス又西國ニヒブリ人參ト云

モノアリ伊吹防風ノ類ナリ

廣大和本草

防風 和産所在ニ多シニ種アリ葉芳ニ似テ光

澤アルモノ和名ヤマゼリ又一種胡蘿蔔葉ニ似

タルモノヤマニンジント云○漢種上品享保中

種子ヲ傳テ今官園及世上多アリ葉白頭莖ニ似

テ花又不密毛ナクメ文理アリ厚強ニノ緑白色

夏ノ末小白花ヲ開ク形芍薬蓴本花ニ類ス根至

テ纖長三四尺ニ至ルモノアリ

物類
品隲

防風 ハマオホ子

延喜式

ハマニガナ

和名
鈔

ハ

マスカナ 同上

一名 曲方氏

輟耕錄

屏風菜

村家方

山花菜鎮江府志

防手萬病必愈

享保年間ニ渡ルトコ

口ノ唐種和州字陀城州八幡ニテ栽出ス葉ノ形

白頭翁ザカイサウ

葉ニ似テ大二厚ク毛ナク光滑ナリ色白

ヲ帶テ防葵ボクシニシム葉ノ色ノ如シ

一根數十葉叢生ス

年ノ者ハ莖ヲ起ス高サ三尺許枝又ヲ分ツ一甚

繁シ夏秋細又ゴトニ花ヲ開ク碎小白色セリ芍花ノ

如シ實ハ獨活シニウドノ如シ

已ニ實ヲ結ブモノハ根枯

朽ス故ニ根ヲ取モノハ二年ヲ良トス三年ナル

者ハ根硬ク用ユルニ堪ズ凡諸藥草大抵此ノ如

シ江戸ニテ栽ル者ハ根甚長ク三四尺ニ過徑リ
 四五分ニメ白色ナリ京師ノ官園及和州ニテ
 栽ル者ハ根長サ一尺五寸許ニメ淡白色ナリ是
 土地ニヨリテ然リ根ヲ切バ内ニ黒キ圈アリ此
 ノ本草原始ニ金井玉欄ト云其内ニ菊^{キキ}花紋^{ハナ}アリ
 藥用ニ上品トス然レ京師ノ藥舗ヘハ宇陀ヨリ
 少シ出スノミナリ諸州ニ此種ヲ栽テ宜シカル
 ベシ今舶來者ハ形小ク蘆頭上ニ葉ノ莖ヲ一寸
 餘連子タリ其形禿^{ハル}筆頭ノ如シ故ニフデ防風

ト云真物ナレ^レ氏皆陳久ニ^{ムシ}ノ蟲蛙多シ 今藥圃

ニテ真ノ筆防風ト云アリ一名伊吹防風 山人

參 青蒿葉ノ防風江州伊吹山ノ自然生也根細

長六七寸ニ^ノ堅實ナリ肥地ニ栽ル者ハ微々潤

ヒアリ其葉ハ^{ニンジン}胡蘿蔔葉ニ似テ細小ニ^ノ毛ナシ

深綠色莖ヲ起ス^テ二尺許多ク枝又ヲ分チ小白

花簇生スル^{セリ}^ハ苜蓿花ノ如シ子モ苜蓿子ノ如シ是即

^{ハニシ}邪蒿ノ一種細葉ナル者ニ^ノ防風ノ類ニ非ス

又別ニ一種諸州ニ^ヤ山人參ト呼者アリ葉略芹菜

二似タル故ニ芹葉ノ防風氏云京師白河山ニ多
キ故ニ白河防風氏云葉硬クノ光アリ初ハ數葉
叢生ス秋ニ至レバ莖高サ二三尺許枝梢ニ花ヲ
開ク花實氏ニ川芎ニ同ジ根長サ六七寸黃白色
ニノ硬シ是集解ノ石防風ナリ本草原始ニ俗呼
山防風ト云リ此根舶來遠志中ニ多ク混入スト
云 又藥舖ニ削リ防風一名五島防風 水防風
ト云アリ是卽防葵ナリ毒草類ニ本條アリ亦防
風ニ非ズ人參類ニテハ牡丹人參 御免人參ト

称スル者アリ此根白クノ大ナリ堅ニ割テ乾ス
故ニケヅリ防風ト云又別ニ濱防風アリ春
間菜店ニ嫩菜ヲ貨食品トス八百屋防風ト云又
伊勢防風トモ云海濱ニ自生ス根皮黄赤ニノ疣^ボ

瘡アリ常州羽州奥州肥前ノ五島ヨリ薬舗ニ出
ス是菜類ニノ防風ニ非ズ釋名屏風楚辭ニ

載トコロノ屏風ハ菴^{アサ}ノフナリ同名異物ナリ本
草

綱目
啓蒙

防風 舶來上品ナリ然レ華舶載來者鮮ク藥肆

和産ノ江戸防風或伊吹筆防風ト呼モノヲ代用
然レ是本草集解ノ石防風ニテ真防風ニ非ス先
年享保年中有章院殿漢種ヲ取ヨセ官園ニ種ユ
甚繁茂シ根ノ長サ三五尺ニ及ビ最漢土ニ勝レ
リ然レ此實絶テ民間ニ出ズ然ル所寛政二年庚
戌秋大執政松平越中守源定信郷民ニ信政ヲ施
シ天下ニ令命有リ江戸段ヲ馬峰長崎ノ官園ニ
被_レ命漢種蜜産種ノ種子ヲ悉ク公ニス余モ是ヲ
乞テ家園ニ培養ス幸ニ土地ニ應ジ長サ三五尺

肥大滋潤東都ノ産ニ同ジ是ヲ用テ藥功大ニ勝タ

リ

石坊風

山^ニ

ニンジン

五島防風ハマ防風

卽本草萊ノ部ノ防葵ナリ

藥名考

防風

回芸

ビヤウブダサ

ハマオホエ

唐

ノ筆防風ト称スルモノ佳和モ真五トウ防風ハ

マ防風ハ劣レリ和ノ水防風ケヅリ防風ハ偽物

ナリ形フデニ似テ毛アルモノ真トス○防羊

ボウフウナリ○銅芸 バウフウナリ○蘭根

ボウフウナリ○回芸 バウフウナリ○回草

本草通串

パウフウナリ 薬品手引草

ボウフウ 畿内及藝州信州ニテ山ニンジント

イフ 是和名ナリ 按ニ今野萊トナス物ハ瀆防風ナ

リ江戸ノ市ニアルモノ相州鎌倉ヨリヲ、クコ

レヲ出ス莖葉フトクシテ ニンジン 胡蘿蔔ニ似タル物真

ノ防風ナリ 物類稱呼

防風 箒防風一名山^ナ人參 筑前 一名山ゼリ一名

高山人參 安藝 一名河原人參 伊勢 根ニ近キ處ニ

毛アリ包^ヅ之又至テ細葉毛アル者攝津山中ニ生

ス又苜蓿ノ者アリ又漢種 官園ニアリ又石防
風アリ筆防風ノ中ニ於テ求ムベシ削防風一名
五島防風伊豫上品日向五島次之濱防風一名伊
勢防風ト呼ブ菜蔬トスベシ出雲伊勢若狹因幡
播磨遠江ヨリ出ス

千金方
藥註

防風 大和本草所云ノ筆防風真ナリ俗ニ山人
參ト稱ス加賀白山是ヲ出ス和人參ト稱ス濱防
風ハ今藥店五島防風ト云海濱多ク有之嫩苗ヲ
採食ス色紅ニノ可愛網目石防風ノ説ニ能合ヘ

リ松岡氏濱防風ヲ防葵ノ一種トスルハ臆見ナ

リ防葵ハトガリ防風ト称ス不可用本草正譌

防風 カルウイ蠻語箋和蘭 今漢種官園ニ多アリ

葉ハ白頭翁ニ似テ毛ナク厚ク粉綠色三年ヲ經

ル物夏月莖ヲ抽テ枝ヲ分テ枝ノ末ゴトニ傘狀

ヲナシテ小白花攢簇ス形芳ノ如シ根黃白色ニ

ノ大サ母指ノ如ク長サ三四尺ニ及ブ和産ノ筆

防風又伊吹防風氏云荷蘭ニテギリイキスモレ

ヤト云 一種ヤマニンジンハ 蘭山邪蒿ニ充

シ物也然此二種ハ漢種防風ニ質近キモノナ
リ備急本草ニ解州防風也又和名ノ防風ト云テ
食料ニ供スルモノアリハマ防風又鎌倉防風ト
モ云澄元ハコレヲ石防風ト云備急本草河中府
石防風也救荒本草通解

防風 一名遼草本草和名引兼名苑 苘芸同上 同雲同上 引釋

藥性 百種共ニ同上 夏友同上引 山花菜鎮江府志 へ

クブクニモル東醫寶鑑 蠻名ギリイキヌモレヤ

荷 蘭 へルテステンキテコウ 唐種ノ防風ハ享保

年中ニ渡リ和州城州諸國ニウエ今處々ニ藥園
中多ク作り出ス春宿根ヨリ生ス葉ハ白頭翁ニ
似テ毛ナク厚ク粉綠色三年ヲ經ルモノ夏月莖
ヲ抽テ高サ二尺餘枝ヲ分チ小ナル傘狀ヲナシ
テ小白花攢生ス後實ヲ結ブ竊衣子ニ似テ條理
ナシ根長キモノ三四尺黃白色大サ母指ノ如ク
蘆頭ニ葉ノ枯タルアトノ毛ノ如クニナリテ筆
ノ如シ故ニ筆防風ト名クコレ蘇恭ノ說ニ牡蒿
附子苗等ニ似タリト云是ナリコレヲ本草原始

ニ金井玉欄ト云上品ニノ藥用スベシ一種本邦
ニテヤマニンジン一名伊吹防風ト稱スルモノ
アリ其葉胡蘿蔔ニ似テ小ナリ武州山野常刈筑
波山ニモアリ白花ヲ開キ傘狀ヲナス根黃白色
防風ニ似タリコレヲ和産ノ筆防風ト云コレ蘇
頌ノ説ニ似青蒿而短小春初時嫩紫紅色ト云又
備急本草ニ圖スル所ノ解州防風是ナリ又本邦
古ヨリ防風ト稱スルモノアリコレ和名抄ニハ
ハマスカナ延喜式ニ云ハマオホ子ト云モノニノ

古へ防風トセシモノナルベシ此物海濱ニ生ス
 ルユへハマ防風ト云又伊勢防風氏言春宿根ヨ
 リ生シ前胡ニ似テ圓ク厚ク光澤アリ莖紅色根
 長サ二尺許節アリテ香氣アリ西湖云筋骨疼痛
 ニ用テ功アリト云コノ嫩芽ヲ採食料トスルユ
 へ八百屋防風トモ云太田氏はヲ石防風ニ充ツ
 卽備急本草河中府石防風ニノ時珍云處ノ珊瑚
 菜一名山花菜江南通志山突同上ト云蘭山云一種山人
 參ト云アリ葉略荇葉ニ似タルユへ荇葉ノ防風

ト云京師白川山ニ多キユヘ白川防風又セリバ
人參氏云葉硬ノ光アリ初ハ數葉叢生シ秋ニ至
レハ莖高サ二三尺許リ花實トモニ川芎ト同ジ
根長サ六七寸黃白色ニシテ硬シ是集解ノ石防風
ナリ本草原始ニ俗呼山防風ト云ヘリ此根舶來
遠志中ニ多ク混入スト云又ケヅリ防風一名五
島防風又水防風ト云ハ毒草類ノ防葵ニテ防風
ニ非ズ釋名屏風楚辭ニ載ルトコロノ屏風ハ荅
ノヲナリ同名異物ナリ解諸菜毒ヲ用防風一味播

冷水灌之

本草
穿要

防風

唐種^{カラタチ}

防風ナリ享保年中ニ渡ル葉ハ白頭

翁ニ似テ毛ナク粉緑色莖高サ二尺餘形水芹^{セリ}花

ニ似テ白色細小竇ハ竊衣^{ウヤ}ヲミニ似テ糙^{ザラ}澁^{シブ}ナ

シ根長キモノ三四尺又ナク黄白色蘆頭ノ處ニ

枯葉ノ莖アリテ筆ノ如シ故ニ筆防風ト名ツク

藥用ニ上品ナリ

一種

伊吹防風

和俗

下總小金武

州山野ニモアリ葉ハ胡蘿蔔^{ニンジン}ニ似テ小莖高サ二

尺許小白花傘狀ヲナス根黄白色防風ニ似テ短

シ一種白川山ニアリテ白川防風ト称スルモノ
ハ石防風ナリ又一種俗ニボウフウト呼テ食料
スルモノハ時珍云トコロノ珊瑚菜ナリ

本草
圖譜

防風本草 是ハ藥ニ入ナリ料理ニ用ルボウフウ

トハ別ナリ防風ハ享保年中漢種渡リ今多シ山

畑ノ野土ソチ厚キ地ニ植ベシ春種タネヲ蒔ナリ又舊根

ヲ植ルニハ二三月ヨシ竹ニテ穴ヲアケサシ入

テ土ヲ柔ニスベシ尤畑タネヲ冬中ニ肥コシシ置ベシ

水草

種育

風名鈔 ○ハマ久力ナ

防風
延喜式

○
波ハ
末一

才
木
子

防風延喜

式

和訓鈔

防風

俗云草人參又云筆防風

按國史所載防風之訓似指防葵

近江伊吹陸奥南部常陸水戸河内金剛山豐前豐

後筑前出之或云是邪蒿此說難信今大和宇陀養

漢種肆中謂之真防風又有朝鮮種近來官園養

之其葉嫩綠根長盈二尺又有濱防風卽珊瑚菜也

今伊勢出之又有岳人參生高山日向高千穗峰尤

爲多細葉光滑其氣辛臭蓋石防風也此二種俱不

中藥用藥舖所謂タリ削防風卽防葵也或以換用防風

者否

本草綱目纂疏

ボウフウ

通名

防風

物品識名

防風

根

吳綬曰以黃色而潤者爲佳

舶來ノモノヲ藥舖ニ唐

ノ筆防風ト云真ナレ臣今希ナリ且陳久ニノ用

ニタヘズ

和産ナシ今漢種ヲ傳栽テ大和宇陀

ヨリ藥舖ニ出ス是ヲ宇陀防風ト云真ナリコノ

外真ノ防風伊吹防風筆防風江戸防風ト呼モノ

ハ綱目萊類ニ所載ノ邪蒿ナリ五島防風削防風

瀬戸防風薩摩防風ト呼モノハ綱目毒草類ニ所

載防葵ナリ並ニ防風ノ類ニ非ズ誤用ベカラズ

又濱防風ト云モノハ漢名詳ナラザル者ナリ和

方ニ往往用之日用藥品考

防風 ハマオホ子延喜式 ハマニガナ和名 ハ

マスカナ同上 和産防風ト稱ル者多シ江州伊吹

山ニ産スルヲ伊吹防風ト云一名筆防風氏云葉

形胡蘿蔔葉ニ似テ毛茸ナク深綠色莖ヲ抽キ高

サ二三尺枝又ヲ分チ白花簇生スルセリ 芥花ニ似

夕リ根長一六七寸許堅實ニノ藥用トス卽邪蒿
一種細葉者ナリ 又白川防風 五島防風 濱
防風アリ藥用ニ堪ズ享保年中漢種渡リ今館園
ニ多シ葉形白頭翁^{セガイサウ}葉ニ似テ大ノ厚ク其實防葵
葉ノ如ク白ヲ帶ブ是ヲ唐種防風ト云一根數葉
叢生ス肥地者ハ二年ニノ根ヲ採リ藥用トス薑
ヲ抽キ花ヲ生者ハ高サ三四尺許花形獨活^{シキヤク}花ノ
如ク傘ヲ成シ白花ヲ開ク花生ル片ハ根輕虛ナ
リ故ニ花前ニ根ヲ掘レバ堅實ニシテ長サ三尺

許藥用尤佳ナリ
救荒本草啓蒙

防風 屏風 防羊
唐種 享保年中ニ渡ル所ノ

唐種ヲ和州ノ宇多城州ノ八幡ニ栽工出ス俗ニ
 此ヲ藤助防風ト云 真防風一名伊吹防風又山

人參ト云花實トモ芥ニ似タリ即チ邪蒿ノ一種
 ニノ防風ニアラズ又一種諸州ニ山人參ト呼ブ
 モノアリ葉芥ニ似タリ故ニ芥葉防風ト云京師
 ノ白川山ニ多シ故ニ白川防風ト云是石防風ナ
 リ俗ニ山防ト云 五島防風新防風又水防風又

ムキ防風氏云是卽毒草類ノ防葵ナリ

瀆防風

八百屋防風ト云又伊勢防風氏云卽珊瑚菜ニア

ツルモノナリ

手板
發蒙

防風 和名ハマバウフウ 琉球國志略疏之屬

防風根如小蘿蔔可醃食 海邊砂地ニ自生ス故

ニ瀆防風ト云藥品ノ防風ト異ナリ葉ハ前胡ニ

似テ小ク末尖ラズ圓厚シテ光澤アリ地ニ就テ

叢生ス莖紅紫色四月莖ヲ抽ク高サ尺許白花傘

ヲナシテ葉本ノ如シ根ハ黃赤色ニシテイボ多

シ春嫩葉ノ時取食フ菜店へ出ス故ニ琉球國志
略ニ蔬ノ屬トス百品考

防風逐風散骨節疼

○今通名

本經曰防風味甘温主

大風猶曰中風頭眩痛惡風風邪行周身骨節疼痛案其

性能耐於暑熱而惡寒冷其根直入土甚深味甘温

滋潤故其能逐風溼浮散骨間滯氣除疼痛○夏月

甚易蛀須曝乾桂枝芍藥知母湯諸支節疼痛身體

尨羸脚腫如脫頭眩短氣温温欲吐侯氏黑散治大

風四肢煩重心中惡寒不足者撰品防風有數種其

稱種防風者

或呼藤助防風

根形如大指而長尺五七寸留

蘆頭二寸許味甘溫滋潤者良是享保中所始栽漢

種者今出和州字陀又江戶防風

或呼真防風

其根微屈

曲長五七寸黃褐色味淡苦是石防風也出佐州羽

州又伊吹防風形如鼠尾長五六寸亦留蘆頭

故或呼筆

防風是邪蒿根也出江州伊吹又五島防風形肥大如

獨活劑粗皮

故呼劑防風

是防葵根也又瀬戶防風形似

種防風白褐色味淡薄是濱防風根也並非真又今

稱舶來者形色與伊吹防風相似是他藥中混來者

不足信用○防風春生芽於宿根葉似白頭翁而滑

澤綠白色一根叢生高七八寸其根肥大長者二三

尺秋冬採根經年者夏秋抽長莖開細白花古方藥

土人參防風一種生高山苗高一尺許七八月開


花九十月結子土党參性冷辛丑陳得據其根

苗實各方土產人參卽其性氣功用可知辛丑宋宜

質問
本草

本草通串卷四十四

本草通串卷四十五



富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

獨活

獨活味苦平主風寒所擊金瘡止痛安豚痢瘰癧音熾女

子疝瘕久服輕身耐老一名羌青一名護羌使者神環

本經大觀本草

二五通串

獨活

本草經曰獨活一名護羌使者味苦平生益州久服

輕身

神農本草經
太平御覽

獨活

本經
上品

釋名羌活

本經

羌青

本經

護羌使者

本經

主治

風

寒所擊金瘡止痛奔豚痢瘕女子疝瘕久服輕身耐

老

神農本草經
本草綱目

獨活味苦平主風寒所擊金瘡止痛實豚痢瘕女子

疝瘕久服輕身耐老

羌活

羌青

護羌使者

神農

本經

盧

復手錄

羌活獨活味苦平主風寒所擊金瘡止痛奔豚痢瘕

女子疝瘕

神農本草經疏
○吳懷祖輯要

本草云主風寒所擊金瘡止痛實豚痢瘕女子疝瘕

療諸賊風百節痛風無久新者

神農本草
湯液本草○

獨活味苦甘平主風寒所擊金瘡止痛實豚痢瘕女

子疝瘕久服輕身耐老一名羌活一名羌青一名護

羌使者

神農本草經○增
補藥物類纂

獨活甘微溫無毒療諸賊風百節痛風無久新者一

名胡王使者一名獨搖草此草得風不搖無風自動

生雍州川谷或隴西南要二月八月採根暴乾

名醫別錄

本草
○大觀

獨活釋名獨搖草別錄此草得風不搖無風自動故名

獨搖草集解別錄曰獨活生雍州川谷或隴西南要

二月八月采暴乾氣味別錄曰微溫主治療諸賊風

百節痛風無間久新名醫別錄○
本草綱目

羌活甘辛微溫無毒療諸賊風百節痛風無久新名醫

別錄○吳
懷祖輯要

獨活微溫無毒療諸賊風百節痛風無久新者一名

胡王使者一名獨搖草此草得風不搖無風自動生

雍州川谷或隴西南安二月八月採根暴乾梁陶弘景名醫

別錄○增補
底物類纂

獨犬相得而鬪也从犬蜀聲羊爲羣犬爲獨也一曰

比嚙山有獨谷獸如虎白身豕鬣尾如馬徒谷切韻

水流聲从水谷聲古活切說文

吳氏本草曰獨活一名胡王使者神農黃帝苦無毒

八月採此藥有風花不動無風獨搖吳普本草○太平御覽

釋名胡王使者吳普本草○本草綱目

陶隱居云藥名無豚實恐是盡實此州郡縣並是羌

地羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州北部
西川爲獨活色微白形虛大爲用亦相似而小不如
其一莖直上不爲風搖故名獨活至易蛙宜密器藏

之神農本草陶弘景
註○大觀本草

獨活釋名弘景曰一莖直上不爲風搖故曰獨活集

解弘景曰此州郡縣並是羌地羌活形細而多節軟

潤氣息極猛烈出益州北部西川者爲獨活色微白

形虛大爲用亦相似而小不如至易蛙宜密器藏之

氣味弘景曰藥無豚寶恐是蠱寶也
神農本草陶弘景註水草綱

目

雷公云採得後細剉拌淫羊藿裛二日後暴乾去淫

羊藿用兔煩人心

炮炙論○
大觀本草

修治數曰采得細剉以淫羊藿拌挹二日暴乾去藿

用兔煩人心

炮炙論○
本草綱目

豚寶爲之使

藥對○大
觀本草

氣味之才曰豚寶爲之使

藥對○本
草綱目

甄權曰獨活味苦辛治諸中風濕冷奔喘逆氣皮膚

苦痒手足攣痛勞損風毒齒痛羌活治賊風失音不

語多痒手足不遂口面喎斜遍身痛痺血癩

藥性論

氣味權曰苦辛 主治獨活治諸中風濕冷奔喘逆氣

皮膚苦痒手足攣痛勞損風毒齒痛羌活治賊風失

音不語多痒手足不遂口面喎斜遍身痛痺血癩

甄權

藥性論
本草綱目

唐本注云療風宜用獨活兼水宜用羌活

唐本注○大觀本草

發明恭曰療風宜用獨活兼水宜用羌活

唐本注○本草綱目

獨活味苦甘平微溫無毒主風寒所擊金瘡止痛賣

豚疝瘰癧女子疝瘕療諸賊風百節痛風無久新者久

服輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌使者一

名胡王使者一名獨搖草此草得風不搖無風自動

生雍州川谷或隴西南安二月八月採根暴乾千金翼方

都知多良 味少苦辛 之六七月發花乎細白色九

十月採根日尔乾用大同類聚方

獨活 宇度又云乃太良一名獨搖草新撰字鏡

獨活陶景注云不爲風搖故名獨活一名羌活一名羌青一名護羌

使者一名胡王使者一名獨搖草陶景注云此草得風不搖無風自搖

一名薇薔出兼一名口花使者出雜要訣和名字止一

名都知多良

本草和名

臣禹錫等謹按藥性論云獨活君味苦辛能治諸中風濕冷奔喘逆氣皮肌苦痒手足攣痛勞損主風毒齒痛又云羌活君味苦辛無毒能治賊風失音不語多痒血癩手足不遂口面喎斜遍身痛痺

蜀本草掌禹錫按○

大觀本草

獨犬相得而鬪也從犬蜀聲羊為羣犬為獨也一曰

北瑯山有獨裕獸如虎白身豕鬣尾如馬臣錯曰北

瑯山出山海經陟谷反《潛》流聲也從水各聲臣錯按

詩其流活活古活反

說文解字通釋

獨活

本草云獨活一名獨搖草

和名宇止一云豆知多良陶隱

居注云無風自搖故以名之

和名類聚抄

山城國獨活十斤○大和國獨活廿五斤○攝津國

獨活五斤○伊賀國獨活廿斤○伊勢國獨活卅五

斤○尾張國獨活十六斤○參河國獨活二斤○安

房國獨活四斤○下總國獨活五斤○常陸國獨活

二斤○美濃國獨活十斤○越前國獨活四斤○丹

波國獨活卅四斤○但馬國獨活五斤○伯耆國獨

治十二斤○出雲國獨活十一斤○石見國獨活六
 斗○播磨國獨活卅六斤○備前國獨活五斤○安
 藝國獨活十八斤○周防國獨活八斤○紀伊國獨
 活十斤○讃岐國獨活卅斤○伊豫國獨活十七斤
 ○土佐國獨活二斤延喜式

日華子云羌活治一切風并氣筋骨拳攣四肢羸劣
 頭旋明目赤疼及伏梁水氣五勞七傷虛損冷氣骨
 節痠疼□利五藏獨活卽是羌活母類也

日華本草
○大觀本

草

釋名大明曰獨活是羌活母也主治羌獨活治一切
風并氣筋骨攣拳骨節酸疼頭旋目赤疼痛五勞七
傷利五臟及伏梁水氣

大明
日華子
本草綱目

陶經曰獨活羌活出雍州川谷或隴西南安今蜀漢
出者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫
結實時葉黃者是夾石上生葉青者是土脈中生此
草得風不搖無風自動故一名獨搖草二月八月採
根暴乾用本經云二物同一類今人以紫色而簡密
者爲羌活黃色而作塊者爲獨活一說按陶隱居云

獨活生西州益州北部色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味亦不與羌活相類用之微寒而少效今又有獨活亦自蜀中來形類羌活微黃而極大收時寸解乾之氣味亦芳烈小類羌活又有槐葉氣者今京下多用之極效驗意此爲真者而是人或擇羌活之大者爲獨活殊不知爲當大抵此物有兩種西蜀者黃色杏如密隴西者紫色秦隴人呼爲山前獨活古方但用獨活今方旣用獨活而又用羌活茲爲謬矣篋中方療中風纔覺不

問輕重便須吐涎然後次第治之吐法用羌活五六兩以水一大斗煎取五升去滓更入好酒半升和之以牛蒡子半斤炒下篩令極細以煎湯酒斟酌調服服吐如已昏眩卽灌之更不可用下藥及謬針灸但用補治湯餌自差

圖經○大觀本草

集解頌曰獨活羌活今出蜀漢者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時葉黃者是夾石上所生葉青者是土脉中所生本經云二物同一類今人以紫色而節密者爲羌活黃色而作塊者爲獨

活而陶隱居言獨活色微白形虛大用與羌活相似
今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味亦不與羌活
相類用之微寒而少効今又有獨活亦自蜀中來類
羌活微黃而極大收時寸解乾之氣味亦芳烈小類
羌活又有槐葉氣者今京下多用之極効驗意此爲
真者而市人或擇羌活之大者爲濁活殊未爲當大
抵此物有兩種西蜀者黃色杏如蜜隴西者紫色秦
隴人呼爲山前獨活古方但用獨活今方旣用獨活
而又用羌活茲爲謬矣

蘇頌圖經
本草綱目

文州獨活 鳳翔府獨活 茂州獨活 文州羌活

寧化軍羌活

二月八月備急本
採根暴乾草圖按

獨活曰羌青曰護羌使者曰胡王使者曰獨搖草得

風不搖無風自動雖與羌活異條而亦曰羌活

昆蟲
草水

略

本草經曰獨活一名護羌使者味苦平生益州久服

輕身 吳氏本草曰獨活一名胡王使者神農黃帝

苦無毒八月採此藥有風花不動無風獨搖

太平
御覽

發明劉完素曰獨活不搖風而治風浮萍不沉水而

利水因其所勝而爲制

劉完素○本草綱目

獨活

珍云頭眩目暈非此不能除

羌活 珍云骨節

痛非此不能除

張元素珍珠囊○湯液本草

氣味

元素曰獨活微溫甘苦辛氣味俱薄浮而升陽

也足少陰行經氣分之藥羌活性溫辛苦氣味俱薄

浮而升陽也手足太陽行經風藥並入足厥陰少陰

經氣分

主治

散癰疽敗血

元素

發明

風能勝濕故羌活

能治水濕獨活與細辛同用治少陰頭痛頭暈目眩

非此不能除羌活與川芎同用治太陽少陰頭痛透

開利節治督脉爲病脊強而厥

張元素○本草綱目

象云若與細辛同用治少陰經頭痛一名獨搖草得

風不搖無風自搖去皮淨用心云治風須用又能燥

濕經云風能勝濕羌活象云治肢節痛利諸節手足

太陽經風藥也加川芎治足太陽少陰頭痛透關節

去黑皮並腐爛者用心云

去溫濕風

李東垣藥類法象○湯液本草

主治治風寒濕痺酸痛不仁諸風掉眩頸項難伸

李杲

○本草綱目

獨活氣味與羌活同無毒氣厚味薄升也苦辛足

少陰腎經行經之藥液云獨活細而低治足少陰伏

風而不治太陽故兩足寒濕痺不能動止非此不能

治羌活

氣微溫味苦甘平苦辛氣味俱輕陽也無

毒足太陽經厥陰經藥太陽經本經藥也液云君藥

也非無爲之主乃却亂反正之主太陽經頭痛肢節

痛一身盡痛非此不治又云羌活足太陽厥陰少陰

藥也與獨活不分二種後人用羌活多用鞭節者用

獨活多用鬼眼者羌活則氣雄獨活則氣細故雄者

入足太陽細者入足少陰也又錢氏瀉青丸用此壬

乙同歸一治也或問治頭痛者何答曰巨陽從頭走

足惟厥陰與督脈會于巔逆而上行諸陽不得下故

令頭痛也

湯液本草

獨活

豚寶爲之使

味苦甘平性微溫無毒升也陰中之陽

也其用有三諸風掉眩頭項難伸風寒濕痺兩足不

用反爲足少陰之引經熱性獨活療諸風不論久新

△

獨活羌活

本來同頭痛筋攣風氣撓獨活羌活本

同類但紫色而節密者爲羌活黃色而作塊者爲獨

活味苦甘平微溫無毒羌活

○君羌活氣雄

獨活氣細味苦甘平

性微溫無毒升也陰中之陽也其用有五散肌表八
風之邪利周身百節之痛排巨陽肉膚之疽除新舊
風濕之証乃手足太陽表裏引經藥也溫性羌活明
目驅風除筋攣腫痛

藥性賦

主治去腎間風邪搜肝風瀉肝氣治項強腰脊痛

好古

發明好古曰羌活乃足太陽厥陰少陰藥與獨活不
分二種後人因羌活氣雄獨活氣細故雄者治足太
陽風濕相搏頭痛肢節痛一身盡痛者非此不能除
乃却亂反正之主君藥也細者治足少陰伏風頭痛

兩足濕痺不能動止者非此不能治而不治太陽之

證王好古○

本草綱目

集解機曰本經獨活一名羌活本非二物後人見其

形色氣味不同故爲異論然物多不齊一種之中自

有不同仲景治少陰所用獨活必緊實者東垣治太

陽所用羌活必輕虛者正如黃芩取枯飄者名片芩

治太陰條實者名子芩治陽明之義同也況古方但

用獨活無羌活今方俱用不知病宜兩用耶抑未之

考耶本草會誌○

本草綱目

獨滑 主治較羌稍殊乃足少陰表裏引經專治痛風
與少陰經伏風而不治太陽經也故兩足濕痺不能
動履非此莫痊風毒齒痛頭眩目暈有此堪治雖伏
治風又資燥濕經云風能勝濕故也但今賣者多採
土當歸假充不可不細辨爾 羌滑 味苦甘辛氣平微
溫氣味俱輕升也陽也無毒多生川蜀亦產隴西得
風不搖無風自動因又名獨搖草也本與獨活同種
後人分有二名紫色節密者爲羌黃色成塊者爲獨
今醫家用羌滑多用鞭節用獨滑多用鬼眼羌滑則

氣雄獨滑則香細氣雄者入足太陽香細者入足少陰是知羌滑本手足太陽表裏引經之藥而又入足少陰厥陰二經名列君部之中非比柔懦之主此誠撥亂反正大有作爲者也故小無不入大無不通能散肌表八風之邪善利周身百節之痛排巨陽肉腐之疽除新舊風濕之證須去黑皮腐爛煎服方有神功如若加入川芎立止本經頭痛謨按會編云羌滑獨滑本經既云同種再無別條則非二物可知矣後人因見形色氣味畧殊故立異論不思物之不齊物

之情也是以羌滑獨滑雖□一種而一種之中亦有
 不同有緊實者有輕虛者仲景用獨滑治少陰必緊
 實者東垣用羌滑治太陽必輕虛者正如黃芩取枯
 飄者名宿芩用治太陰取圓實者名子芩用治陽明
 義也況古方但用獨滑今方既用獨滑又用羌滑不
 知病宜兩用耶抑不知未之考耶 第四卷桑根白

皮欵後謨

按宜參看本草蒙筌

發明嘉謨曰羌活本手足太陽表裏引經之藥又入
 足少陰厥陰名列君部之中非比柔懦之主小無不

入大無不通故能散肌表八風之邪利周身百節之

痛陳嘉謨曰
本草綱目

兩平章羌活
錄輟耕

獨活味苦甘辛性微溫無毒入肺腎二經主新舊諸

風濕痺頸項難伸腰背痠疼四肢攣痠黃色而作塊

者爲獨活 按獨活氣濁屬陰善行血分斂而能舒

沉而能升緩而善搜可助表虛故入太陰肺小陰腎

以理伏風羌活味苦甘平性微溫無毒入小陽膀胱

二經散入表風邪利周身節痛排巨陽腐肉之疽除

新舊風濕之症紫色而節密者爲羌活 按羌活氣

清屬陽善行氣分舒而不斂升而能沉雄而善散可

發表邪故入手太陽小腸足太陽膀胱以理遊風其

功用與獨活雖若不同實互相表裏用者審之雷公

云

採得後細剉拌搖羊藿蒸二日藥性
後曝乾去搖羊藿用免煩人心解

獨活 味苦甘辛氣溫無毒氣味俱薄浮而升陽也

足少陰行經氣分血分之藥

冠氏曰獨活是羌活母也出漢蜀西羌者良春

生苗狀如青麻一莖直上有風不動無風自搖故名
獨搖草六月開花作叢或黃或紫生砂石中者葉微

黃生肥土中者葉青翠有兩種一種形大有白如鬼
眼者今人呼爲獨活一種蠶頭鞭節色黃紫臭之如

蜜蠟香今人呼爲羌活近以老前胡及土當歸長尺許白肉黑皮氣亦芬香如白芷用充獨活不可不辨○蘇氏曰羌活獨活乃一種二物正如川芎撫芎雲朮腿朮之義入用微有不同後人以爲二種者非矣今人以紫色節密者爲羌活黃色作塊者爲獨活今蜀中有一大獨活類羌活微黃而極大收時寸解之氣味亦芳烈又有塊葉氣者用之極效驗意此爲真者今市人或擇羌活之大者爲獨活殊爲未當○李時珍曰乃一類二種以中國者爲獨活西羌者爲羌活蘇氏所說甚明又按易簡方云羌活須用紫色有蠶頭鞭節者獨活是極大羌活有如鬼眼者○又按獨活一名羌活本非二物後人見其形色氣味不同故爲異論然物多不齊物之情也一種之中自有不同有緊實者有輕虛者仲景用獨活治少陰必緊實者東垣用羌活治太陽必輕虛者正如黃芩取中枯而飄者名宿芩治太陰圓實而堅者名子芩治陽明之義相○獨活善行血分祛風行濕散寒之藥也凡病同也

風之證如頭項不能屈伸腰膝不能俛仰或痺痛難
行麻木不用皆風與寒之所致暑與濕之所傷也必
用獨活之苦辛而溫活動氣血祛散寒邪故本草言
能散脚氣化奔豚療疝瘕消癰腫治賊風百節攻痛
定少陰寒鬱頭疼意在此矣○羌活祛風逐濕升陽
發散之藥也如頭痛目疼發熱惡寒腰脊強痛四肢
拘急乃風寒之證也或頭重目眩四肢怠惰腰膝拳
攣難以俯仰乃風濕之證也以此苦辛之劑功能條
達肢體通暢血脈攻徹邪氣發散風寒風濕故瘍證

以之能排膿托毒發潰生肌目證以之治羞明隱淫
腫痛難開風證以之治痿癱癲癩麻痺厥逆蓋其體
輕而不重氣清而不濁味辛而能散性行而不止故
上行于頭下行于足遍達肢體以清氣分之邪之神
藥也○又有血虛頭痛及遍身骨痛因而兼寒熱者
此屬內虛當用歸芍熟地白朮知母枸杞丹皮等類
誤用風藥反致增劇○丹溪先生云獨活羌活均能
祛風燥濕者也然而表裏上下氣血之分各有所長
羌活氣雄入太陽外行皮表而內達筋骨氣分之藥

也獨活氣細入少陰內行經絡而下達足膝血分之藥也所以羌活有風寒發散之功而解太陽故目證瘍證風痺等證爲必用也獨活僅可爲風濕寒邪之用而治少陰厥陰故奔豚疝瘕腰膝脚氣等疾爲必用也二物一種其主治有不同者如此○繆仲淳先生曰羌獨二活稟天地正陽之氣以生名列君部非比柔懦之主大無不通小無不入却亂反正之上藥也故能開萬竅而出八風之邪通四大而利關津之鍵羌獨本同一種但分質有老嫩虛實氣有厚薄緩

急之殊耳○盧不達先生曰動搖萬物者莫疾乎風故萬物莫不因風以爲動搖惟獨活不然有風獨立不動無風能動搖在蜀名獨活在羌名羌活隨地以名亦隨地有□□其從治一切不能獨立不動而爲風寒刀刃之所擊□風而痛者及奔豚癰瘕之因風以爲動搖者女子疝瘕因風以爲堅築者惟獨活氣味溫辛而苦復因風而及乎上下因風而出入開闔能啓太陽之闔而開能入厥陰之開而闔具備風水化氣之體用者故奏功獨捷歟○繆仲淳先生曰獨

活羌活陽草中之風藥也本爲祛風散寒除濕之要
品風能勝濕以其性燥故也本草諸書並載主中風
及諸風不和真中風惟西北遼塞高寒之地風氣剛
猛虛人受之往往卒中或口眼歪斜或口噤不語或
手足癱瘓左右不仁或剛痙柔痙角弓反張此藥與
諸風藥並可用也若夫江南吳楚越閩百粵鬼方梁
州之域從無剛勁之風多有濕熱之患質柔氣虛多
熱多痰其患中風如前等病外證雖一一相似而其
中實非卽劉河間所謂將息失宜水不制火丹溪所

謂中濕中痰中氣是也此則病係氣血兩虛虛則內
熱煎熬津液結而爲痰熱則生風故致卒倒亦如真
中風狀而求其治療之方迥若天淵外邪之氣勝則
實實則瀉之祛風是已如內而真氣不足則虛虛則
補之調氣補血生津清熱是已倘誤用風藥反致燥
竭其津液血愈不足而病愈沉困命曰虛虛攻補既
謬死生遂殊粗工惜昧執迷不悟茲特表而明之○
廣濟方云治冬月傷寒太陽經頭痛身疼發熱惡寒
無汗者用羌活杏仁甘草○治太陽陽明頭痛兼遍

身骨痛用羌活入葛根湯○治四時感冒風寒用羌
活沖和湯○治下身一切風濕濕熱用羌活蒼白朮
秦艽生地苡仁木瓜革薢黃蘗○治風熱上攻齒牙
腫痛用羌活赤芍生地薄荷荆芥蔓荊子石膏○六
經頭風頭痛用羌活川芎蒼耳荊芥黃芩天麻○陳
延之小品方云治中風不語用真獨活一兩炒黃大
豆五合炒黑以酒乘熱投蓋之良久溫服二合未瘥
再服○治產後中風語謇四肢拘急用真川羌活二
兩爲末每服五錢水煎服○外臺秘要治歷節風痛

用真川羌活松節各等分酒煮每早晚各飲一盃○
治風牙腫痛用真川獨活煮酒熱嗽之○續補集方
治腳氣腫脹痛用真川獨活五錢木瓜牛膝各一兩
共爲末每服三錢空心白湯調下○治奔豚氣或瘕
疝築疼痛用真川獨活羌活各一兩吳茱萸三錢荔
枝核小茴香各五錢共爲末每服三錢空心白湯調
下○治下部癰腫用獨活羌活各二錢防風柴胡桔
梗金銀花連翹川芎赤芍藥各一錢五分水煎服○
治賊風百節攻痛用川獨活羌活防風當歸各二錢

水煎服○治少陰寒鬱頭痛用川獨活五錢防風二

錢水煎服本草
彙言

獨活獨一也活生也一莖直上不爲風搖故名獨活

羌活羌地名言出于羌胡活同前義故名羌活獨活
多生

川蜀亦產隴西得風不搖無風自動因又名獨搖草

也兩足濕痺不能動履非此莫痊風毒齒痛頭暈目

眩有此堪治雖伏治風又資燥濕經云風能勝濕故

也形虛大類南羌活色黃香如蜜此爲真者市有擇

羌活之大者爲獨活殊未爲當又有一種土當歸深

類獨活但肉白聞之臭氣薰人賣者假充獨活不可

不細辨爾○南西色蒼紫味並芳烈咸堪治療今人

多用鞭節○味苦甘平微溫無毒能散肌表入風之

邪善理周身百節之痛排巨陽

肉腐之疽除新舊風濕之症

雷公云採得後細
剉拌

羊

藿蒸二日後曝乾去本草
淫羊藿用免煩人心原始

獨活釋名長生草時珍曰獨活以羌中來者爲良故

有羌活胡王使者諸名乃一物二種也正如川芎撫

芎白朮蒼朮之義入用微有不同後人以爲二物者

非矣集解時珍曰獨活羌活乃一類二種以中國者

爲獨活西羌者爲羌活蘇頌所說頗明按王貺易簡

方云羌活須用紫色有蠶頭鞭節者獨活是極大羌

活有白如鬼眼者尋常皆以老宿前胡爲獨活者非

矣近時江淮山中出一種土當歸長近尺許白肉黑

皮氣亦芬香如白芷氣人亦謂之水白芷用充獨活
解散亦或用之不可不辨修治時珍曰此乃服食家
治法尋常去皮或焙用爾氣味苦甘平無毒發明時
珍曰羌活獨活皆能逐風勝濕透關節但氣有剛
劣不同爾素問云從下上者引而去之二味苦辛而
溫味之薄者陰中之陽故能引氣上升通達周身而
散風勝濕按文系曰唐劉師貞之兄病風夢神人曰
但取胡王使者浸酒服便愈師貞訪問皆不曉復夢
其母曰胡王使者卽羌活也求而用之兄疾遂愈

本草

綱目

羌活味苦辛氣平而溫升也陽也無毒入足太陽足少陰二經又入足厥陰善散風邪利周身骨節之痛除新舊風濕又止頭痛齒疼古人謂羌活係君藥以其撥亂反正有旋轉之力也而余獨以爲止可充使而併不可爲臣佐蓋其味辛而氣升而性過于散可用之爲引經通達上下則風去而濕消若恃之爲君臣欲其調和氣血變理陰陽必至變出非常禍生反掌矣故羌活也加之于當芎朮苓之內以逐邪返正

則有神功耳羌活與獨活本是兩種而各部本草俱
言爲一種者悞仲景夫子用獨活以治少陰之邪東
垣先生用羌活以治太陽之邪各有取義非取緊實
者謂獨活輕虛者謂羌活也蓋二物雖同是散邪而
升降之性各別羌活性升而獨活性降至于不可爲
君臣而止可充使者則彼此同之也○或問九味羌
活湯古人專用之以散風寒之邪今人無不宗之而
吾子則羌活爲充使之藥毋乃太輕乎曰羌活雖敗
風邪而實能損正邪隨散解正又隨散而俱解矣九

味羌活湯雜而不純余最不取外感風邪治法安能
出仲景夫子之範圍內傷而兼外感治法安能出東
垣先生之範圍全治外感遵仲景夫子治內傷之外
感遵東垣先生又何風邪之不去而必尚九味羌活
湯爲哉○或疑潔古老人創造九味羌活湯以佐仲
景公之不述是其平生學問全在此方而先生薄羌
活而并輕其方余謂先生過矣嗟乎潔古創造九味
羌活湯者因仲景公方法不明于天下而東垣先生
尚未創制補中益氣之湯不得已而立此方以治外

本草通串二
感實所以治內傷也今東垣先生既已有補中益氣湯實勝乎九味羌活湯遠甚又何必再用潔古之方哉至于治外感之法莫過仲景公傷寒書之備外感善變豈羌活區區一方卽可以統治六經傳經之外感耶況仲景公傷寒書經鐸與喻嘉言之開發而益明故外感直用其方斷乎無疑若九味羌活湯實可不用潔古老人平生精力徒耗于此方雜而不純又何足尚余是以輕之豈爲過哉○或謂羌活獨活同是散藥羌活性升而獨活性降升則未免有浮動之

虞與其用羌活不若用獨活之爲安嗟乎有邪宜散
升可也降又可也無邪可散散藥切不可用又何論
于升降乎况二味原自兩種數同而升降各別又爲
可亂用之哉

本草
新篇

獨活 羌青 護羌 獨搖草 胡王使者

羌活

兩平章

事物
異名

獨活羌活出雍州川谷或隴西南安蜀漢出者佳春
生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時葉
黃者是夾石上所生葉青者是土脉中生此草得風

不搖無風自動故一名獨搖草二月八月採根暴乾
 用本經云二物同一類今人以紫色而節密者爲羌
 活黃色而作塊者爲獨活一說獨活生西川益州北
 部色微白形虛大用與羌活相似一名羌青一名護
 羌使者一名胡王使者味甘平微溫無毒治一切風
 筋骨疼痛四肢羸劣頭旋目赤疼勞傷虛損冷氣王
 義三才
 圖會

獨活有八〇一羌活
通雅

獨活以是喜性平一云微溫味甘苦一云辛無毒療

諸賊風百節痛風無久新者治中風失音喎斜癱瘓

遍身痺痺及筋骨攣痛○生山野中二月三月九月

十月採根暴乾此草得風不搖無風自動故一名獨

搖草

本草

○一莖直上得風不搖故曰獨活乃足少陰

行經藥也獨活氣細羌活氣雄

入門

○療風宜用獨活

兼水宜用羌活今人以紫色節密者爲羌活黃色而

作塊者爲獨活

本草

○獨活氣細而色白治足少陰伏

風故兩足寒濕痺不能動非此不除

湯液

羌活古立川

性微溫味苦辛無毒主治與獨活大同小異

本草

○羌

活乃手足太陽足厥陰少陰表裏引經之藥也撥亂

反正之主大無不通小無不入故一身百節痛非此

不能治

門入

○羌活氣雄故入足太陽獨活氣細故入

足少陰俱是治風而有表裏之殊

湯液

○我國惟江原

道獨活羌活俱產焉

俗東醫方寶鑑

獨活

辛苦微溫氣緩善搜入足少陰氣分

腎以理

伏風治本經傷風頭痛頭運目眩

宜與細辛同用

風熱齒痛

文潞公藥進用獨活地黃等分爲末每服三錢

瘰癧濕痺

項背強直手足反張曰瘰癧濕流關節

痛而煩曰濕痺風勝

奔豚疝瘕

腎積曰奔豚風寒濕客于腎之所致瘕疝

亦然 有風不動無風反搖又名獨搖草 故治本經云

獨活一名羌活古方惟用獨活後人云是一類二種

遂分用以形虛大有曰如鬼眼節疎色黃者爲獨活

色紫節密氣猛烈者爲羌活並出蜀漢又云自西羌

來者名羌活

故又名胡王使者今採諸家所分經絡主治各註以便施用

羌活辛

苦性溫氣雄而散味薄上升入足太陽 膀胱以理遊風

兼入足少陰厥陰氣分 肝腎 瀉肝氣搜肝風小無不入

大無不通治風濕相搏本經頭痛

同用芎治太陽少陰頭痛凡頭痛多

用風藥者以巔頂之上唯風藥可到也

督脉爲病脊強而厥 督脉並剛

二 三
瘕柔瘕

有汗為柔瘕亦有血虛發瘕者大約風瘕宜

二 治血

中風不語按古人治中風多主外感率用續

虛忌用

命愈風諸湯以發表用三化湯麻

仁九以

攻裏至河間出始云中風非外來之風良由

心火暴

甚腎水虛衰東垣則以為本氣自病丹溪以

為濕生

痰痰生熱熱生風世人復分北方風勁質厚

為真中

南方地卑質弱為類中不思歧伯云中風大

法有四

一偏枯半身不遂也二風痺諸風類痺狀不收也三

風瘕奄

忽不知人也四風痺諸風類痺狀不收也三

矣何嘗

有真中類中之說乎此症皆由氣血虧虛腎

者不知

養血益氣以固本徒用烏附羌獨以驅風命

曰虛虛

誤頭旋目赤要藥散肌表八風之邪利周身

人多矣

百節之痛為却亂反正之主藥若血虛頭痛遍身痛

者此屬二活並禁用

增訂本草備要

羌活禀天地正陽之氣氣厚於味浮而升陽也爲足
太陽行經風藥獨治氣味俱薄浮而升陽也爲足少
陰引經之藥並入足厥陰少陰經氣分羌活氣雄獨
活氣細雄者治足太陽風濕相搏頭痛肢節痛一身
盡痛者非此不能除乃卻亂反正之君藥也細者治
足少陰伏風頭痛兩足濕痺不能行動非此不能除
皆能逐風勝濕散肌表八風之邪利周身百節之痛
二藥本一種第質有虛實老嫩氣有厚薄不同耳○
同麻黃甘草主冬月卽病傷寒太陽經頭疼發汗解

表①同前胡黃芩麥冬甘草治春時瘟疫邪在太陽
頭痛○入葛根湯治太陽陽明頭痛兼遍身骨痛口
渴煩熱不得眠若渴煩頭痛甚加石膏知母竹葉○
瘡發太陽經頭痛者於治瘡藥中加之痛止則去之
○同白朮蒼朮秦艽生地薏苡仁木瓜石斛黃蘗治
下部一切風濕濕熱○同生地赤芍丹皮石膏甘草
等水煎治風熱上攻牙腫痛○此陽草中之風藥也
爲祛風散寒除濕之要品如血虛頭痛及遍身痛骨
痛因而帶寒熱者此屬內證誤用反劇

本草經
疏輯要

鎮按諸家辨獨活羌活甚是紛紜有以地辨有以形辨有以色辨有以氣辨殊無的據蓋古人原未有羌活之名則爲一物也明矣其氣味形色悉由地變氣味既變而主治自是有剛柔之異

清何培元本草綱目類纂必讀

獨杜谷切音瀆獾類似獾而大獾性羣獨性特獾鳴

三獨鳴一能食獾獾諺曰獨一叫而獾散○从犬蜀

聲篆作燭同文舉要作𤑔燭非活

戶括切桓入聲正字

通

獨搖草 名醫別錄獨活得風不搖無風自動故名

獨搖草按李時珍曰羌活天麻鬼臼藤銜四者皆名
無風獨搖草又金燈草唐隸皆名獨搖 長生草

本草綱目獨活一名長生草 護羌使者 本草綱

目獨活以羌中來者爲佳故有護羌使者胡王使者

諸名乃一物二種也 兩平章 清異錄侯寧極藥

譜兩平章羌活也 事物異名錄

獨屋濁杜谷切音瀆單也狐也又獸名似猿而大猿

性群獨性特猿鳴三獨鳴一羊爲群犬爲獨 字彙

增本草綱目獨活一名羌活一名羌青一名獨搖草

一名護羌使者一名胡王使者一名長生草陶弘景曰一莖

直上不爲風搖故曰獨活別錄曰此草得風不搖無風自動故名獨搖草李時珍曰獨活以羌中來者爲良故有羌活胡王使者諸名蘇頌曰獨活羌活出蜀漢者自春生

苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時葉黃者是夾石上所生葉青者是土脉中所生本經云二物同一類今人以紫色而節密者爲羌活黃色而作塊者爲獨活而陶隱居言獨活色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味亦不與羌活相類用之微寒而少効今又有獨活亦自

蜀中來類羌活微黃而極大收時寸解乾之氣味亦
芳烈小類羌活又有槐葉氣者今京下多用之極効
驗意此爲真者大抵此物有兩種西蜀者黃色香如
蜜隴西者紫色秦隴人呼爲山前獨活李時珍曰獨
活羌活乃一類二種以中國者爲獨活西羌者爲羌
活按王貺易簡方云羌活須用紫色有蠶頭鞭節者
獨活是極大羌活有白如鬼眼者尋常皆以老宿前
胡爲獨活者非也氣味甘平無毒治風寒金瘡癰疽
疔毒癰諸賊風百節痛風五勞七傷利五臟及伏梁

水氣

彙考增

文系唐劉師貞之兄病風夢神人曰

但取胡王使者浸酒服便愈師貞訪問皆不曉復夢

其母曰胡王使者羌活也求而用之兄病遂愈 別

錄增炮炙論求得細劉以淫羊藿拌搗二日暴乾去

藿用免煩人心

廣羣芳譜

獨活 乃羌活母一名獨搖草

杭州府志

獨搖草

以下

一名獨活多生於嶺南及蜀漢川谷中

春生苗葉夏開小黃花一莖直上有風不動無風自

搖其頭如彈子尾若烏尾而兩片開合間每見人輒

自動搖俗傳佩之者能令夫婦相愛雖非異卉亦自
有一種風致可取根入藥用

秘傳花鏡

獨唐韻集韻韻會徒谷切正韻杜谷切音牘說文

犬相得而鬪从犬蜀聲羊為群犬為獨也 又獸名

珥雅類從曰獨一叫而獲散鼉一鳴而龜伏或曰鼉

鳴夜獨叫曉獨獲類也似獲而大食獲今俗謂之獨

獲蓋獲性羣獨性特獲鳴三獨叫一是以謂之獨也

活廣韻集韻韻會正韻杜戶括切音估水名康熙

字典

獨活和名土知タダ多羅又稱字登ト異名羌活本經獨搖草

別錄 護羌使者 本羌膏 同 長生草 增補異名 胡王使者

多識編

獨活 氣味 苦甘平無毒一云微溫一云甘苦辛氣味

俱薄 異名 羌活 羌青 獨搖草コレ風吹トモ搖

カズ風ナキ時ミヅカラ葉ヲ搖カス故ニ獨搖草

ト名ヅク 羌活 氣味 同獨活 異名 護羌使者 胡王

使者 長生草 和名 都知多羅 宇度 修治 羌活獨

活ハ一物ニノ二種ナリ白朮蒼朮ノ如シ用ルニ

其功微不同也二月八月二根ヲ永獨活ハ羌活ノ

母ナリ獨活ハ色黄キニノ丸マダカニテ大ナリ羌活ハ長

ク色紫ニノ節アリ土氣ヲ洗ヒ皮ヲ去剉ニ乾シ

焙リ用ユ蠶實ヲ使トス能能手ノ太陽小腸足太陽膀胱

引經ノ藥足ノ厥陰肝少陰腎經ニ入○風ヲ療

スルニ獨活ヲ用ユ獨活ハ氣藥ノ方ニ功アリ浮

萍ハ水ニ沉ズノ水ヲ利シ獨活ハ風ニ搖ズノ風

ヲ治ス其勝トコロニ依テ制ス○賊風トテ透間

ノ風ニ中リテ患エ熱スルモノ少陰ノ頭痛頭ユ

ラメキ目眩クモノハ獨活細辛同ジク用テ神効

アリ○足ノ大陽風濕相搏肢節並一身悉ク痛ム
者獨活ニ非ザレハ治セズ○足ノ少陰風内ニ伏
ノ頭痛シ兩ノ足濕痺ノ濕ノ脚氣腫出ル故ニ動
キ難キ者ハ羌活ニアラザレバ治セズ○大陽ノ
頭痛トハ項ジ強バリ拘攣テ痛ムナリコレニ獨
活ヲ用テ効アリ傷寒大陽ノ經惡寒發熱ノ證ニ
用ユ○羌活獨活一物二種功能微シ別也喻エバ
黃芩ノ枯朽タルヲ片芩ト名ク大陰ノ經ヲ治シ
中ノ實シテ小ヲ條芩ト名ケテ陽明ノ經ヲ治ス

本草綱目

ルガ如シ○破傷風ニテ反張スルニ用ユ○肝風
ヲ搜リ肝氣ヲ瀉ス人或ハ暗スケ出鼻ニテ垂下
痛堪ガタク大便ニ血ヲ出ス者ヲ肝脹ト名ク羌
活ノ煎汁ヲ數盃ヲ服ノ自愈毒表虛自汗アルニ
○脉沉細ナルニハ忌沉細ハ寒邪ノ脉也風邪ハ
必ズ浮大ナルモノナリ藥性能毒

羌活 一名獨活 神農本草經 一名羌青 同上 一名護羌使者 同上

一名胡王使者 別錄 一名獨搖草 一名山前獨活

俗名施施烏獨山城 又名烏獨別錄 獨活陶

隱居云藥名無豚寶恐是蠱實此州郡縣並是羌地
羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州北部西
川爲獨活色微白形虛大爲用亦相似而小不如其
一莖直上不爲風搖故名獨活至易蛀宜蜜器藏之
上祐補
中水草○獨活羌活出雍州川谷或隴西南安今蜀

漢出者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或
紫結實時葉黃者是夾石上生葉青者是土脉中生
此草得風不搖無風自動故一名獨搖草二月八月
採根暴乾用本經云二物同一類今人以紫色而節

蜜者爲羌活黃色而作塊者爲獨活一說按陶隱居云獨活生西川益州北部色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味亦不與羌活相類用之微寒而少効今又有獨活亦自蜀中來形類羌活微黃而極大取時寸解乾之氣味亦芳烈小類羌活又有槐葉氣者今京下多用之極効驗意此爲真者而是人或擇羌活之大者爲獨活殊未爲當大抵此物有兩種西蜀者黃色香如蜜隴西者紫色秦隴人呼爲山前獨活古方但用獨活今方旣

用獨活而又用羌活茲爲謬矣

本草圖經

○獨活以羌中

來者爲良故有羌活胡王使者諸名乃一物二種也

正如川芎撫芎白朮蒼朮之義入用微有不同後人

以爲二物者非矣

明李東璧本草綱目

○獨活羌活乃一類二

種以中國者爲獨活西羌者爲羌活蘇頌所說頗明

按王脫易簡方云羌活須用紫色有蠶頭鞭節者獨

活是極大羌活有白如鬼眼者尋常皆以老宿前胡

爲獨活者非矣近時江淮山中出一種土當歸長近

尺許白肉黑皮氣亦芬香如白芷氣人亦謂之水白

芷用充獨活解散亦或用之不可不辨同○獨活曰

羌青曰護羌使者曰胡王使者曰獨搖草得風不搖

無風自動雖與羌活異條而亦曰羌活宋鄭夾際昆蟲草水畧

○王右軍帖云獨活無風則搖有風不動石脾入水

則乾出水則濕出水則濕不見入水乾何自知之近

年夷堅戍志序其畧云葉晦叔聞於劉季高有估客

航海不覺入巨魚腹中未能死遇其開口吸水時適

水工在乃取斧斫魚魚覺痛躍身入大洋舉舩人

及魚皆死或戲難之曰一舟皆死何人談此事於世

乎類前說

宋周輝清波雜志

○婦人疾莫大於產蓐倉卒爲

庸醫所殺者多矣亦不素講故也舊嘗見杜任作醫
準一卷其一記郝貢子婦產四日癰癰戴眼角弓反
張任以爲瘕病與大豆柴胡湯獨活湯而愈政和間
余纔分娩猶在蓐中忽作此症頭足反接相去幾二
尺家人驚駭以數婢強拗之不直適記是方而藥囊
有獨活乃急爲之召醫未至連進幾劑遂能直醫至
則愈矣更不復用大豆柴胡湯不可不廣告人二方
皆在千金第三卷

宋葉少蘊避暑錄話

○獨搖有八一羌活一

鬼臼一鬼督郵一天麻一薇薔一白楊一核楊又媚
藥有無風獨搖草又抱朴子云獨搖芝一名薇薔智
攷薇薔卽麋銜白楊卽核楊此共八

明方以
智通雅

○獨搖

草一名獨活多生於嶺南及蜀漢川谷中春生苗葉
夏開小黃花一莖直上有風不動無風自動其頭如
彈子尾若鳥尾而兩片開合間每見人輒自動搖俗
傳佩之者能令夫婦相愛雖非異卉亦自有一種風
致可取根入藥用清陳誤子
秘傳花鏡○按本經止有獨活之
條謂其爲一名羌活一名羌青一名護羌使者是也

因此種生於雍州川谷或隴西南並是羌地故本經所謂羌活者卽是獨活非二種也然陶隱居言羌活出羌地而益州西川者爲獨活是又一物而二種矣時珍歷據先哲諸說而曰獨活羌活乃一類二種以中國者爲獨活西羌者爲羌活正如川芎撫芎白朮蒼朮之義入用微有不同後人以爲二物者非矣愚謂旣云非二物卽當根據本經以爲用奈何鵠突復以羌活屬羌獨活屬蜀就異地之所產分之爲二乎但川中所產或別是一種獨活並屬可用耳今遵本

經以獨活居前而後亦別出羌活因其用之有別難

以滾同論也

清劉若金廣物本草述類纂

獨活甘苦辛微溫去皮或焙用羌活苦辛溫紫色節

密者去黑皮腐爛用○羌活與獨活種自不同也今

人多以獨活紫牙充羌活誤矣市中有唐羌活其色

不紫者蓋水白芷也水白芷解散亦或用之

本草喉襟

獨活 本經曰獨活羌活二物同一類時珍云獨活

羌活乃一類二種以中國者為獨活西羌者為羌活

本草約言曰獨活與羌活原無二種後人分用今

按一類二種ナルベシ本邦昔ヨリウドノ母ヲ獨
活トシ其小根ヲ羌活トス本草大明曰獨活是羌
活母也トイヘルニヨレリ然レ氏中華ヨリ來ル
獨活羌活ト味カハレリ中華ヨリ來ヲ可用ウド
ノ根ハ不可用羌活或曰一種其葉似前胡又シカ
菜ニ似テ壯大ナルベシト云未_レ知是也藥肆ニア
ル倭羌活ハウドノ根ナリ唐羌活ト別物ナリ本
草ト不合本草曰羌活ハ氣雄_ニ獨活_ニ氣細_ニ今試中華_ニ
之產_ヲ果_ニ然リ本邦之產者與此異不可用二物共

二 中夏ヨリ來ヲ可用○犬ウド ウドニ似タリ

味ヨシ又シ、ウドト云筑紫ニテ鹿菜ト云拾遺

集ノ歌ニシカナヲヨメリ

大和本草

獨活 一名獨
搖草

羌活 和爾
雅

獨活 羌活 長生草 羌青 獨搖草 護羌使

者 胡王使者 和名字止 一云豆知多良 本

綱獨活羌活一物二種也正如川芎撫芎白朮蒼朮
之義入用藥微有不同春生苗葉如青麻六月開花
作叢或黃或紫結實時葉黃者是夾石上所生葉青

者是土脉中所生此草得風不搖無風自動故有獨活獨搖之名 古方但用獨活無羌活今方俱用以

紫色而節密者為羌活黃色而作塊虛大者為獨活

今人用土當歸充獨活不可不辨土當歸白肉黑皮氣亦芬香如白芷

氣

○獨活微溫甘苦辛 羌活性溫辛苦

氣

此與細辛同用此味俱薄

此與川芎同用

也

足少陰行經氣

手足太陽經風藥也

○獨活

主治

足太陽風濕相搏頭痛肢節痛一身盡痛者足小陰

伏風頭痛兩足濕痺不能動止者

△按獨活二三月生苗似蘆筍而

節有短毛青碧色而紫黃白微斑且有小點謂之

獨活茅為蔬和酸茹之香美可賞既長高四五尺一

極五葉有細鋸齒面背皆有細毛六月開白花作叢
婆婆如絲毛秋結實以根上近莖帶紫處爲羌活以
根株塊而黃色處爲獨活如白朮蒼朮之分別蓋花
形色和漢不同今將來之羌活間有無節者是疑土
當歸矣止擇用倭羌獨可也備中平福之產佳藝州
廣島者次之羽州最上獨活ヲ芽有長二三尺者太柔
可食總關東之產太長畿内之產僅五七寸一種有
削羌活欠氣味不可用

倭漢三才圖會

獨活ト倭名抄二本草ヲ引テ獨活一名獨搖草ト

トヒトツニツチダラトイフ並不詳ソノツチダ
ダラノ木トイフモノ、葉ニ似タルガ東
故ニカクイヒシニヤナヲ詳ナラス雅

獨活釋名活生也弘景曰一莖直上不爲風搖故曰
獨活修治洗土氣去皮剉乾焙用按獨活羌活和
產與中華產微似大別中華產亦有二種竹節鞭節
者佳無節黑皮者不佳時珍曰獨活羌活乃一類二
種以中國者爲獨活西羌者爲羌活陶氏曰市人或
擇羌活之大者爲獨活殊未爲當今以所渡者本邦
之市人亦如此也蓋本邦自古用和產而功能不異

中華產則用和而尤可也。蓋羌活獨活主治頗同。但氣有剛劣不同。爾當合見。氣味苦甘平無毒。能入小腸膀胱肝腎四經。主諸風掉眩。百節痛。癢肌皮苦痒。風寒濕痺。兩足不能動。一切風邪。不論久新。齒痛。頰腫。頸項難伸。金瘡奔豚。癰瘰。女子疝瘕。又得細辛治少陰頭痛。毒表虛自汗者。寒邪脉沉細者。忌之。蘇恭曰。療風宜用獨活。兼水宜用羌活。修治用藥須知。二和ノウドノ古根ヲ以テ獨活トス。羌活ハ和産ニナシト云。稻先生ノ説ニハ獨活ハ和産ニナシ

唐ヲ可用羌活ハ唐和氏ニアリト云ヘ氏和藥ハ
取覺ヘズ故ニ賣買ニナシ此モ唐ヲ用ベシ主篤
齋云近來和真ノ羌活ト云物ヲ出ス甚効アリ獨
活ハ和ノ通用ノ羌活ヲ用テ佳ナリ一説今藥肆
ニ通用スル和ノ羌活ト云モノ真ノ獨活也和ノ
羌活ハナシト云此説ト用藥須知ノ説トハ背腹
ノ違ナリ或古根ヲ以テ獨活トシ新根ヲ以テ羌
活トスルハ藥肆通用ナリ醫者モ通例コレヲ用
ユ何レモ誤リ也々々稻先生ノ説ノ如クニ二物

本草綱目

氏ニ唐ヲ用ベシ獨活藥肆ニ唐アリサレドイカ
 ウ古シ古キ中ニ新キヲ撰ビ用レバ元來氣甚シ
 キモノナレバ不苦^{ニカラ}羌活ハ唐ノ中デ黑^{クロ}様^ゲト云ヲ
 用ベシ異齋云漢渡ハ獨活羌活混雜シテ來ル藥
 舗ニテ撰テ本手ノ羌活又ハ竹ノ節手ト云此羌
 活ノ上品ナリ馬皮手ト云ハ獨活ノ一種ニシテ
 下品ノモノナリ氣味辛苦微溫無毒能大抵本書
 ノ如羌活獨活氏ニ大抵似タルモノナリ其内ニ
 獨活ハ下行シ羌活ハ上行ス俱ニ風濕ヲ去ル發

散ノ藥ナリ外ノ一ニアマリ用ルハナイ身痛
ニ用ルモ風濕ノ痛ニ用ルモ少陰經ノ風濕ヲ去
ル故ナリ○羌活釋名時珍曰獨活以羌中來者爲
良故名修治洗土氣去皮判乾焙用當互見獨活也
氣味甘苦平無毒能入小腸膀胱肝腎四經主風寒
濕痺筋骨攣疼頭旋掉眩頭項難伸毒治肢節痛因
于風者宜之若血氣虛而痛者悞用之反致增劇修
治本書ノ如シ獨活ノ下ニ詳ナリ唐ヲ用ユベシ
ト云ヘ氏香ヲキラフモノアリソレニハ和ヲ用

ノミ 三

二

ヘシ少シハ功アリ氣味苦辛溫能本書ノ如シ風
 濕ヲ治スル内ニ獨活ハ風ヲ主リ羌活ハ濕ヲ主
 ル○賊風失聲ニ用ユ○目赤膚痒ニ用ユ手足不
 遂口眼喎斜ニ用ユ○大陽厥陰ノ頭痛ニヨシ發
 汗散表透關節非時感冒ノ仙藥ナリ毒本書ノ如
 シ内傷元氣血虛ノ頭痛ニ勿用片玉六
八本草
 獨活味苦甘平主風寒所擊金瘡止痛貴豚痢瘕女
 子疝瘕久服輕身耐老一名羌活一名羌青一名護
 羌使者神農
本草獨活微溫無毒療諸賊風百節痛風

無久新者一名胡王使者一名獨搖草此草得風不
搖無風自動生雍州川谷或隴西南安二月八月採
根暴乾

梁陶弘景
名醫別錄

勝實爲之使陶隱居考藥名無

勝實恐是蠱實此州郡縣並是羌地羌活形細而多
節軟潤氣息極猛烈出益州北部西川爲獨活色微
白形虛大爲用亦相似而小不如其一莖直上不爲
風搖故名獨活至易蛀宜密器藏之唐本注云療風
宜用獨活兼水宜用羌活臣禹錫等謹按藥性論云
獨活君味苦辛能治諸中風濕冷奔喘逆氣皮肌苦

痺手足攣痛勞損主風毒齒痛又云羌活君味苦辛
 無毒能治賊風失音不語多痺血癰手足不遂口面
 喎斜遍身痺痺日華子云羌活治一切風并氣筋骨
 拳攣四肢羸劣頭旋明目赤疼及伏梁水氣五勞七
 傷虛損冷氣骨節痠疼通利五臟獨活卽是羌活母
 類也

嘉祐補
註本草

○獨活羌活出雍州川谷或隴西南安

今蜀漢出者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或
 黃或紫結實時葉黃者是夾石上生葉青者是土脉
 中生此草得風不搖無風自動故一名獨搖草二月

八月採根暴乾用本經云二物同一類今人以紫色而節密者爲羌活黃色而作塊者爲獨活一說按陶隱居云獨活生西川益州北部色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味亦不與羌活相類用之微寒而少効今又有獨活亦自蜀中來形類羌活微黃而極大收時寸解乾之氣味亦芳烈小類羌活又有槐葉氣者京下多用之極効驗意此爲真者而市人或擇羌活之大者爲獨活殊未爲當大抵此物有兩種西蜀者黃色香如蜜隴西

者紫色秦隴人呼爲山前獨活古方但用獨活今方
旣用獨活而又用羌活茲爲謬矣蓋中方療中風纔
覺不問輕重便須吐涎然後次第治之吐法用羌活
五六兩水一大斗煎取五升去滓更入好酒半升和
之以牛蒡子半升炒下篩令極細以煎湯酒斟酌調
服取吐如已昏眩卽灌之更不可用補治湯餌自差
宋蘇頌圖
經本草 ○獨活主治較羌稍殊乃足少陰表裏引
經專治痛風與少陰經伏風而不治太陽經也故兩
足濕痺不能動履非此莫痊風毒齒痛頭眩目暈有

此堪治雖伏治風又資燥濕經云風能勝濕故也但
今賣者多採土當歸假充不可不細辨爾謹按會編
云羌活獨活本經旣云同種再無別條則非二物可
知矣後人因見形色氣味略殊故立異論不思物之
不齊物之情也是以羌滑獨滑雖係一種而一種之
中亦有不同有緊實者輕虛者仲景用獨活治少陰
必緊實者東垣用羌活治大陽必輕虛者正如黃芩
取枯飄者名宿芩用治大陰取圓實者名子芩用治
陽明義也況古方但用獨活今方旣用獨滑又用羌

滑不知病宜兩用耶抑不知未之考耶

明陳嘉謨
本草蒙筌

機謹按陳嘉謨云凡風濕作痛之證古方每用獨活
寄生湯煎調百發百中今人服之杳無奏其功者豈
非藥不得真之故歟況古明醫用藥立方必以主病
者爲君所用川獨滑桑寄生俱能去風勝濕以爲主
藥誠爲合宜奈今賣藥之家因難得真往往收採水
寄生指爲桑寄生媒利種雖同類氣味大殊且川獨
滑亦未辨認分明每用土當歸假代兩俱燥性耗衛
敗榮無益有虧寧不增劇近幸茨山吳氏辨認獨活

原本羌滑一種以節密輕虛者爲羌節疎重實者爲獨川續斷與桑寄生氣味略殊主治頗同不得寄生卽加續斷便立名曰羌活續斷湯使醫者不泥於專名病家勿誤其假藥仁恩傳濟何其淵哉 ○獨活

以羌中來者爲良故有羌活胡王使者諸名乃一物二種也正如川芎撫芎白朮蒼朮之義入用微有不同後人以爲二物者非矣

明李時珍本草綱目

○獨活羌活乃

一類二種以中國者爲獨活西羌者爲羌活蘇頌所說頗明按王貺易簡方云羌活須用紫色有蠶頭鞭

節者獨活是極大羌活有白如鬼眼者尋常皆以老宿前胡爲獨活者非矣近時江淮山中出一種土當歸長近尺許白肉黑皮氣亦芬香如白芷氣人亦謂之水白芷用充獨活解散亦或用之不可不辨上同○

又按獨活一名羌活本非二物後人見其形色氣味不同故爲異論然物多不齊物之情也一種之中自有不同有緊實者有輕虛者仲景用獨活治少陰必緊實者東垣用羌活治大陽必輕虛者正如黃芩取中枯而飄者名宿芩治大陰圓實而堅者名子芩治

陽明之義相同也

清倪朱謨本草彙言

○獨活生雍州川谷或

隴西南安今出蜀漢者佳春生苗葉夏開小黃花作

叢一莖直上不爲風搖故爲獨活其根黃白虛大氣

香如蜜亦有作槐葉氣者此草得風不搖無風自動

故別錄名獨搖草氣味苦甘平微溫無毒君藥也

同上

○獨活類老前胡尋常皆以老宿前胡爲獨活非矣

近時江淮中出一種土當歸長近尺許肉白皮黃氣

極穢惡獨活山人每呼香白芷又謂之水白芷用充

獨活解散亦或用之不可不辨色黃白亦有淡黑色

本草通串 卷二
氣香二月八月永根今人用根只畫根形

明李中立
本草原始

○獨活羌活弘景曰一莖直上不爲風搖故稱獨活
按本經止有獨活之條謂其爲一名羌活一名羌青
一名護羌使者是也因此種生於雍州川谷或隴西
南安並是羌地故本經所謂羌活卽是獨活非二種
也然陶隱居言羌活出羌地而益州西州者爲獨活
是又一物而二種矣時珍歷據先哲諸說而曰獨活
羌活乃一類二種以中國者爲獨活西羌者爲羌活
正如川芎撫芎白朮蒼朮之義入用微有不同後人

以爲二物者非矣愚謂旣云非二物卽當根據本經以爲用奈何鶻突復以羌活屬羌獨活屬蜀就異地之所產分之爲二乎但川中所產或別是一種獨活並屬可用耳今遵本經以獨活居前而後亦別出羌活因其用之有別難以復同論也

清劉雲密本草述

○鎮按

諸家辨獨活羌活甚是紛紜有以地辨有以形辨有以色辨有以氣辨殊無的據蓋古人原未有羌活之名則爲一物也明矣其氣味形色悉由地變氣味旣變而主治自是有剛柔之異

清何倍元本草綱目類纂必讀

○獨活

羌活出雍州川谷或隴西南安蜀漢出者佳春生苗
葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時葉黃者
是夾石上所生葉青者是土脉中生此草得風不搖
無風自動故一名獨搖草二月八月採根暴乾用本
經云二物同一類今人以紫色而節密者爲羌活黃
色而作塊者爲獨活一說獨活生西川益州北部色
微白形虛大用與羌活相似一名羌青一名護羌使
者一名胡王使者味甘平微溫無毒治一切風筋骨
拳攣四肢羸劣頭旋明目赤疼勞傷虛損冷氣

明王
思義

三才圖會○增
補庶物類纂

獨活 試効 療風寒濕痺頭項頸腮顏面腰脊手足筋
骨關節拘攣疼痛一切眼疾赤痛障翳歷節痛痺皮
膚苦痒瘰疾透關利節 撰修 凡撰獨活以藥鋪呼
和羌活長條色青白氣芬烈者爲佳用時水洗剉細獨
活元唯一種坊間分呼宿根爲獨活新根爲羌活宿
根性味俱劣故今定以新根呼羌活者爲獨活充用
且屢拭施每覺的効要之本是一也又有華舶載來
羌活比之此邦獨活氣甚猛烈卽是近道諸山所有

俗呼失失シシ烏獨ウド者一名乙奴烏獨イヌウド一名烏獨ウド水獨ミヅウド吉キチ

大同小異本類之至近者也獨活此邦俗呼烏獨ウド春

夏采嫩茅燂食氣芳味微苦清香脆軟蔬中之上品

也失失烏獨シシウド猶云鹿獨活シシウド乙奴烏獨イヌウド猶猶辨正按神農

本草獨活一名羌活一名羌青一名護羌使者未始

有別以出羌地者良故冠羌字蘇頌曰古方但用獨

活今方既用獨活而又用羌活茲爲謬矣王好古曰

羌活與獨活不分二種汪機曰神農本草獨活一名

羌活本非二物後人見其形色氣味不同故爲異論

古方但用獨活無羌活今方俱用不知病宜兩用耶
抑未之考耶此三氏甚有識見其他漫爲穿鑿附會
之說者古今和華滔滔皆是畢竟大同小異如後世
所別求與蒼朮之意耳用者須知此意

一本堂藥撰

獨活 和漢共ニアリ和ハウドノ根ナリ漢ノ毛
ノ種類不一大抵獨活羌活前胡土當歸藁本防風
此種類相似テ不同和ハ宿根ヲ以テ獨活トシ新
根ヲ以テ羌活ニ充ツ大明ガ說ノ獨活ハ羌活ノ
母也ト云說ニ本ヅキテ古來日本ニ習用テ不察

其異獨活羌活元來兩種ナリ世ニウドハ其氣味
ノ薄キヲ以テ疑フモノアリ然モ賣モノ久ク水
ニ漬シテ氣味ヲ脱ス欲其色白ナリ山中ヨリ掘
リ來リ新ニ製スルモノ氣味ヨシ可用羌活漢真
ナリ但シ古今所渡モノモ二三種アリ和ニモ又
有之藥家ニハタゞ獨活ノ新根ヲ以テ分ツ二活
前ノ獨ノ下ニ辨スルガ如シ羌活和名犬ウド、
云又シ、ウド、云又カラナト云モアリ是近年
漢ヨリ所渡ノ羌活也大抵種類多其シ、ウド、

云モノ疑ハ藥性纂要ノ西羌活乎

兩平草
○羌活出

陶南村
輯耕錄

羌青

羌活○毒用藥
世保元
須知

獨活羌活

ウド

唐ヨリ來ルモノ香氣甚シ羌

活獨活トモニ唐和ノ二種アリ古來日本ニモ若

根ヲ以テ分ツハ集解ノ大明ノ説ヨリ日本ニテ

モ分ツ也羌活山産ノシ、ウド又今又ウド、云

物真也香氣至テ真也別本ニ云羌活獨活實二一

種也獨活ウド羌活シ、ウド

本草
會誌

獨活 撰修曰獨活元只一種坊間分呼宿根爲獨

活新根爲羌活宿根性味俱劣故今定以新根呼羌
 活者爲獨活充用 齋按本邦以老嫩分二活也蓋
 本於大明說而人皆未察焉耳近來又出稱真羌活
 者卽是本書所謂失失烏獨シシ而亦獨活異種者也予
 屢試之雖非無其効氣味猛烈而人多厭服故用古
 來呼爲羌活者爲佳 又曰有華舶載來羌活比之
 此邦獨活氣甚猛烈卽是近道諸山所有俗呼失失
 烏獨ウ者一名イヌ奴烏獨ウ 齋按今坊間所鬻華產羌
 獨活有三種而其本未始別斯三種來但 本邦藥

鋪就其形質差異而辨別之以爲獨活一種爲羌活

二種耳一種呼馬皮樣羌活者卽是本書所謂失失

烏獨之類也一種稱明真羌活者紫色鞭節味苦辛

氣芳烈可以爲上矣 又其自註曰烏獨水獨吉猶

云[賽]獨活 齋按賽當改假正字通賽字下曰說文

報也今俗報祭曰賽願又相誇勝曰賽蓋吾方言水

獨吉_ト呼似而非者也卽與華語假元魚假蛤蚧_ト俱見

老東京錄假河豚_ト見張耒明之假同又如言賽群芳_ト見

觀芍賽蘭_ト見張謙德瓶華譜賽王魁_ト見薛鳳翔者皆

藥譜暨陳湜子花鏡

是美稱而相誇勝之謂也故慎懋官華夷草木考曰

蜀中有花名賽蘭

一名伊蘭

花小如金粟香特馥烈冠于

萬卉可以證矣

辨正

曰蘇頌曰爾爾王好古曰爾爾

汪機曰爾爾此三氏甚有識見其他漫為穿鑿附會

之說者古今和華滔滔皆是云云

齋按本草蒙筌

曰古方但用獨滑今方既用獨滑又用羌滑不知病

宜兩用邪抑不知未之考邪又王文潔藥性大全曰

大抵此物有兩種西蜀者黃色香如蜜隴西者紫色

秦隴人呼為山前獨活古方但用獨活而又用羌活

茲爲謬矣又何培元本草必讀曰諸家辨獨活羌活
甚是紛紛有以地辨有以形辨有以色辨有以氣辨
殊無明據蓋古人原有羌活之名則爲一物也明
矣其氣味形色悉由地變氣味旣變而主治自是有
剛柔之異又本草述曰此種生於雍州川谷或隴西
南並是羌地故本經所謂羌活者卽是獨活非二種
也豈止所謂三氏者哉修德尚未深考耳○又按宋
葉夢得避暑錄話載獨活治產後痙病有神驗之說
不知信然否乎且表出以備考證

非藥撰

羌活ハ和名シ、ウド羌活獨活古方ニ二物ナシ
唯宋朝以來分テ二物ト又古方ニテハ羌活一名
獨活ナリ今時珍ガ説ニ從フトキハ獨活ハ和名
ウド羌活ハ和名シ、ウド、スベシ今中土ヨリ
來ルモノ獨活羌活トモニシ、ウドヲ蒸シ熟シ
乾シタルモノナリ馬皮竹節トテ藥舗ニテ分レ
氏本ハ一櫃中ヨリ擇分ルモノナリ是又混雜ナ
リ本邦ニテハ昔ヨリ獨活羌活ヲ分ツハ皆ウド
ノ古根ヲ獨活トシ新根ヲ羌活トスルナリ近代

真ノ羌活ト云モノアリ即チシ、ウドナリ花舗

ニテシヤクナト云ナリ廣大和
本草

獨活羌活 シ、ウド イヌウド ウマウド城
州

貴一名獨滑本草 地頭乙戸邑郷藥
本草 護羌使

者事物
異名 山中ニ多ク生ス苗大抵土當歸ニ似タ

リ葉モ亦相似テ數ナリ食用ニ中ラズ莖葉ニ毛

アリテ糙澀ス夏以後莖ヲ起シ葉互生ス秋ニ至

リ高サ六七尺枝端ゴトニ小白花ヲ開ク數百攢

簇シ傘蓋ノ如シ後實ヲ結ブ並ニ大葉ノ芍薬ニ

異ナラズ其根白色臭氣烈シテ微香アリ暴乾セ
バ内淡白色ニノ外皮淺黒色市人呼デ真羌活ト
スル者ハ非ナリ是獨活ノ一種下品ナル者ナリ
其氣味最猛烈病人厭ヒテ服スルヲ能ハザル者
多ケレバ代用ユベシ獨羌二活ノ説古來紛紛タ
リ頌ハ二物一類トシ機ハ本非ニ物ト云時珍ハ
一類二種トス士鐸モ兩種トス今是ニ從フ和名
鈔ニ獨活ヲウド、訓ス其後正保年間ヨリ
ウドノ宿根ヲ獨活トシ或ハウドノ全根ヲ獨活

トス皆非ナリ古漢渡ハ獨活羌活ヲ一器ニ混入
ス長崎ニテ擇分テ本手馬皮手前胡手ノ三品ト
ス總テ羌活ト稱ノ四方ニ貨ス其本手ノ羌活ト
稱スル者ハ真ノ羌活ナリ其前胡手ト稱スル者
ハ輕虛ニノ黃色味辛シ是真ノ獨活也ト云傳フ
レ凡其後久シク渡ラズ馬皮手ト稱スル者ハ今
多渡ル是下品ナレ凡獨活トスベシ即シ、ウド
ナリ新渡ノ獨活寛政中京師ニ來ル即シ、ウド
ノ根ナリ 羌活 ウドモドキ ウドタラシ

一名羌滑本草蒙筌

兩平草輟耕錄

兩平章事物異名

古

ヨリ土當歸ノ嫩根紫色ナル者ヲ羌活トス今藥
鋪ニウド羌活ト呼ビシ、ウドノ根ヲ真ノ羌活
ト呼ブ皆用ルニ堪ズ舶來水手ノ羌活一名竹ノ
節手ノ羌活ト呼モノ真物ナリ根ニ節アリ又横
丈多ク紫黒ニシテ香氣アリ味辛シ然レバ久シク
渡ラズ近年他ノ藥品中ヨリ擇ビ出ス者アレバ
少シ新渡獨活中ニモ少シ混入セリ寛政末年ニ
渡ル羌活真ノ竹節手ナリ又ウドモドキノ根

暴乾スレバ紫色鞭節ニノ香氣アリテ本手ノ羌
活ニ相似タリ氣味ハ少シ異ナレバ代用ノ可ナ
ルベシ其草京師清瀧河ノ旁ニ生ズ高雄邊ニ最
多シ故ニ高雄羌活ト呼苗葉花實シ、ウドニ異
ナラズ惟莖葉ノ節深紫色切バ香氣アリ 一種
京師崑崙ノ嵐山ニ ヤブウド、稱スル者アリ
一名ハナウド 崑崙ウド クワズウド葉ハシ
シウドヨリ大ニノ蘿蔔葉ノ態アリ花ハ五月ニ
開クシ、ウドニ似テ周圍ノ花半辦長クノ美シ

故ニ花ウド、云其根生乾ニ白色臭氣多シ市
人用テ羌活ニ偽ルモノアリ宜ク擇ビ去ベシ本草

綱目
啓蒙

獨活シ、ウド根ヲ掘リ暴乾スヨコニスダアリ
香氣有羌活ウドモドキ根ヲ掘リ暴乾ノ少紫黑
色ヨコニ筋有藥名考

獨活附羌活或疑獨活與羌活或以爲二品或以爲一

品顧漢渡者其種不一如何曰獨活與羌活乃一類
二種也後人以獨活紫茅充羌活大明所謂獨活是

羌活母也故司醫者習用而不察其異以爲一物者
非矣獨活世俗呼之^ウ蕪脫者是也羌活^ウ莖葉相似而
微有不同世人呼之^シ十^シ蕪脫又呼之^ウ要^ウ拉^ウ拿^ウ疑藥
性纂要言西羌活乎凡此物尤多市中有唐羌活其
色不紫者蓋水白芷也但有解散之功^{草木}辨疑

獨搖草不^詳一名獨活^{シ、ウ}ナリ^ウ獨活^ウヲ^ウウドト^ハ訓スル^{土當歸}

ハ非也○此條ニ舉ル文段獨活ニアラズ本綱雜草

部ニ載ル無風獨搖草也獨活一名獨搖草ニ因テ

混雜ス取ベカラズ

^{秘傳花}
鏡譯說

獨活 ウド○西國ニテ シカトイフ西國ニテ

ハ土中ニ有テ 獨活トイヒ二三寸地上ニ生ジ

タルヲ ウドトイフ尺以上ニナリタル物ヲ

シカト呼ブ 阿部氏云松前千砂野ノ濱ヨリ真

ノ獨活ヲ出ス土人コレヲ サイキト云京嵐山

ニモ有 シ、ウド又イヌウドトイフ

物類
稱呼

獨活 獨搖草 ツチダラ ウド 和佳唐貴ケ

レ氏不好○獨搖草 ドククハツナリ○長生草

ドククハツナリ○護羌使者 ドククハツナ

リ 羌活 胡王使者ウド和白^シ香^シキモノ佳唐貴

ケレ氏不真○羌青 ケウクハツナリ○胡王使

者 ケウクハツナリ○兩平章 ケウクハツナ

リ 藥品手
引草

獨活 和名ウド備中平福安藝廣島出羽最上ヨリ

出ス上野^{ウノ}羌活ハ獨活ナリ獨活ハ緊實羌活ハ輕

虚ナリ 羌活 和名ウドモドキ 山城^{ヤマキ}總本^{ソウホン}茅^チ亦^タウ

ドモドキト名ク名護屋ウドハ別ナリウドノ類

ナリ市家^{チケ}莖^シヲ羌活トシ根^ネヲ獨活トス華産ハ二

物ナリ唐羌活ハ氣峻シ羌活山城嵐山ノ者ハ細

葉ナリ香氣甚シ

千金方
藥註

獨活 大和本草獨活羌活二物一類ノ諸説ヲ舉

ク然レモ漢渡羌活ハ和ノ獨活ト同ジカラズ又

ウドノ根ヲ不可用ト云松岡氏ハ和ハウドノ根

ナリ山中ヨリ取來リ新ニ製スルモノ氣味ヨシ

可用ト云案スルニ圖人所種ノウドハ多ク肥汁

糞土ヲ用ヒ嫩莖紫色ナルヲ賞翫ス根味其真ヲ

失ス山中自然ニ生スルハ嫩莖青色ナリトイヘ

ドモ香氣甚烈根モ亦堅實ニノ香氣烈シ真ノ獨

活ナリ貝原氏菜蔬ニ用ユル者ヲ見テ山中ノ者

ヲ不知ニヤ

羌活

漢渡真ナリ近來和産真ノ羌

活出ヅ是シ、ウドノ根ナリ漢渡ノ一種馬尾手

ト云物ニ氣味同ジ可用貝原氏犬ウド一名シ、

ウド羌活ナルコトヲ不知松岡氏西羌活ナラン

ト云是ナリ

本草
正謄

獨活

一名薇薔

本草和名
引兼名苑

花使者

同上引
雜要訣

蜜

名アンケリーカ

アルカンゲリカ

アネモウ

本草通串
不 古ハ獨活羌活ヲ分タズ蘇頌ハ二物一類ト
シ時珍ハ一類二種トス今コレニ從フ今官園ニ
漢種ノ獨活アリ春宿根ヨリ生ズ嫩葉ハ一莖三
枝九葉長ズレバ十葉一莖ニ附ク深綠色ニシテ
光澤アリ陽地ニ栽ルハ幹頗粉紫色ヲ帶毛茸
ナク糙澁セズ初秋莖高サ五六尺稍ニ傘狀ヲナ
ンテ小白花攢生ス後實ヲ結ブ白芷ノ子ニ似テ
扁ク羽アリ根黃色肉黃白色脂液多ク烈香味辛
シコノ物蘇頌說トコロノ今又有獨活亦自蜀中

來類羌活微黃而極大氣味又芳烈今京下多用之
極效驗ト云是ナリコノ物藥用ニ上品ナリ此種
和産アリ野州日光山及信州ニアリシ、ウドク
マウド山福トハ別ナリシ、ウドハ葉ハ食料ノウ
ドニ似テ莖綠色毛茸アリコレハ羌活ナリ古ヘ
獨活ヲウドト訓ズルハ非ナリウドハクランキ槐木ノク
サダチナルモノナリ獨活ノ類ニ非ルヲ實ト根
ノ形狀ヲ視テ知ルベシ本草和名ニツチタラト
訓ズルモタラノキノ草立ノ名ナリ風牙諸痛用

獨活煮酒漱之羌活

和名シ、ウド イヌウド

ウマウド

城

野州日光山常州加波山南臺城

及水曾山中等ニ生ズ葉ハ食料ノウドニ似テ尖
リ又獨活葉ニ似テ毛アリテ溢ル花實モ獨活ト
同ジタ、莖綠色ナリ根皮微黒ク肉白シ氣味猛
烈ナリコレ蘇頌ノ説ニ今人以紫色而節密者爲
羌活ト云是ナリ一種ウドモドキ一名ウドタラ
シト云アリ京ノ高雄山ニアルユへ高雄羌活ト
呼ブソノ葉狹ノ尖リ毛茸アリ形シ、ウド或白

莖葉ニ似タリ節々紫色根皮紫黑色味辛ク香アリ又ヤブウド一名ハナウド一名クハズウドト云アリ江戸増上寺白芷ト云芝増上寺山中及王子邊ニアリ年々宿根ヨリ生ズ五月花アリ白色獨活ニ似タリ莖中空外條理アリ毛茸多ク臭氣アリコレ即土當歸ナリ

本草
穿要

獨活 漢種ノモノハ葉初生三枝九葉長ズレバ數葉一莖ニツキ大サ二尺許深綠色ニシテ光澤アリ幹高サ五六尺粉紫色ヲ帶ブ花ハ白色實ハ

白芷ニ似テ大ニ羽アリ根ノ肉ウスキ黄白色烈香アリ

味辛シ熱湯ヲカケテ乾バ服用シ易シ羌活シ

シウド 信州及野州日光山常州加波山南臺城

等ニ生ズ葉食料ノ穂水ノ一種ニ似テ又多ク光

澤ナク黄緑色根皮黄褐色肉白シ氣味猛烈ナリ

故ニ病人服スルニタヘカスルモノナリ熱湯ヲ

カケテ乾テヨシ ウドタラシ 京ノ高雄山ニ

産スルユヘ高雄羌活ト呼ブ葉尖リ毛茸アリ節

節紫色ニノ花ハ白色根皮紫黑色味辛ク香アリ

蘇頌ノ説ニ今人以紫色而節密者爲羌活トイフ

是ナリ水草
圖譜

羌活ウヰモドキ
草本

將翁先生奥州ヨリ採リ 官園ニ上ル

今世上ニテ御藥園羌活トイフコレナリ野土ノ

肥タルモノヘ植ベシ春ノ彼岸ニ實ヲマキ二年

目ノ秋根ヲ掘リ藥用トスベシ此類三年ニシテ

花實アリテ根枯ル糞水ヲ澆ギテヨシ草木
育種

イヌウド獨治
本綱十二 ○ツチダラ獨治
和名鈔 ○ナマツ

コ獨治
日光 ○ウツ獨治
宇止延喜式 ○ウマウド獨治
城州貴松 ○シ

本草 延喜式

シウド

獨活
本綱十三

○ハナウド

漢名未詳
京嶺山ニ
産ス高七八尺五月

比花アリウドノ類ニノ花美也根生干ノ氣味薄
藥店嶺山羌活ト云ウド羌活ニ交俱ニ真物ニ非

ズ

○ウドキヤウクワツ

羌活
本綱十三

○ウドモドキ

同 ○ヤマウド

羌活

野州白井村

本草藥名備
考和訓鈔

羌活
綱目

ウドタラシ

高雄キヤウクハツ

京都

深山ニアリ形ハ大テイ獨活ニ似テ小ナリ莖紫

色ヲ帶テ香氣ツヨシ花ハ白ク笠ノゴトクツク

世間ニイワユルウドノ形トハ花葉トモニ異レ

リ
四季賞

花集

獨活 本草和名云通知太良新撰字鏡云乃太良

又云于虔指中空俗云士士于虔又云以奴于虔此種

雖有山生野生園生狹葉闊葉之別原一類也故併入于此陸奧津輕產者良然

甚微也又吾藩日向山中產者氣芳味微苦與漢渡

彷彿矣方言士士于虔近視蝦夷東部產其根一竅

重凡六七斤味苦烈不宜市上根爲獨活莖爲羌活

大明云獨活是羌活母也蓋據于此今產於紀伊播磨上野信濃云有

一種于虔毛虔莖莖葉稍小根亦細而有節或以爲

羌活清劉若金本草述云按本經止有獨活之條謂

其爲一名羌活一名羌青一名護羌使者是也因此種生雍州川谷或隴西南安竝是羌地故本經所謂羌活者卽是獨活非二種也然陶隱居言羌活出羌地而益州西州者爲獨活是又一物而二種矣時珍歷據先哲諸說而曰獨活羌活乃一類二種以中國者爲獨活西羌者爲羌活正如川芎撫芎白朮蒼朮之義入用微有不同後人以爲二物者非矣繁嘗閱諸書古方唯用獨活後人分二種以形虛大有曰踈節者爲獨活緊小密節氣烈者爲羌活已

本草綱目
踈節

増コ、ニ説ク如ク新渡ノ獨活ハシ、ウドナレ

氏馬皮手トハ稱セズ恐クハ馬皮手ノ羌活ノ混
清ナルベシ又和産ノ獨活ハ惡臭鼻ヲ衝キ嘔ヲ
發シ食ヲ妨ク最下品ナリ藥用ニ堪ヘズ 羌活

原寛政年中舶來ノ真ノ竹節手ノ羌活ハ卽馬皮
手ノ羌活ニノ今舶來ノ大黃ノ櫃ノ中ニ混ジ來
ル最モ上品ナリ凡ソ藥久シク他藥中ニ混ズル
者必他藥ノ爲ニ其氣ヲ奪ハレ氣味性力ヲ脱ス
然ルニ馬皮手ノ羌活ハ久シク他ノ櫃中ニ藏ス

本草通串

ル者ト雖ト外感鼻塞ノ人コレヲ服スレバ頻ニ
氣管ノ開發スルヲ覺フ真ニ良藥ナリ ウドモ
ドキハ獨活ノ一種莖葉ノ節紫色ナル者ニシテ
活ニハ非ズソノ根惡臭アリテシ、ウドノ根ノ
如シ藥用ニ堪ヘズ又ウドヲ土當歸ニ充ルハ誤
ナリウドハ羌活ノ品類ナリ故ニ山中自生ノウ
ドノ根ハ代用ノ可ナリ但モヤシウド舊根ハ用
ユベカラズ 本草家ノ說各諄々タリト雖ト藥
用ニハ舶來上品ノ者ヲ擇ビニ活互ニ通用スベ

シ清劉若金本草述云按本經止有獨活之條謂其
 爲一名羌活一名羌青一名護羌使者是也因此種
 生雍州川谷或隴西南安竝是羌地故本經所謂羌
 活者卽是獨活非二種也然陶隱居言羌活出羌地
 而益州西州者爲獨活是又一物而二種矣時珍歷
 據先哲諸說而曰獨活羌活乃一類二種以中國者
 爲獨活西羌者爲羌活正如川芎撫芎白朮蒼朮之
 義入用微有不同後人以爲二物者非矣
 シ、ウドイヌ 獨活 ウドモドキ 羌活
 網目啓蒙 物品 識名

本草綱目

獨活根古渡ニ前胡根様ノ羌活ト呼モノアリ是真ノ獨活ナリトイヘ氏今得ガタシ新渡ノ馬皮根様ノ羌活ト呼モノハ和産ノシ、ウ獨活ノ一種ト

ス下品ナレ氏通用ノ可ナリ 和産ニ真物ナシ

藥舗ニ真ノ羌活ト云モノハシ、ウドノ根ニノ

即舶來ノ馬皮根ニ同ジ亦用ユベシ和ノ獨活ト云ノハ土當歸ノ老根ニノ別物ナリ 本邦昔ヨリ根ヲ獨活トシ新根ヲ羌活根古渡ノ本手ノ羌活一名竹ノ節フシデ様ト云モノ紫黑色ニシテ香氣アリ

味辛ク根ニ節アリコレ真ナレト今甚希ナリノコ
品今ハ他ノ藥品或ハ獨活中ニ藥舗ニ前胡様ノ
混ジ來ルモノアレト亦希ナリ
羌活馬皮様ノ羌活ト呼モノハ俱ニ獨活ニシテ
羌活ニアラズ和産ナシ但ウドモドキト云モ
ノ、根暴乾スレバ紫色鞭節ニシテ本手ノ羌活
ニ相似タリ氣味ハ微シ異ナレト代用シテ可ナ
ルベシ然レト藥舗ニイデズ今售トコロノモノ
ハ皆真ニアラズソノ真ノ羌活ト呼モノハ獨活
ノ一種ナリ和ノ羌活ト呼モノハ土當歸ノ嫩根

才章通月

ナリ

日用藥
品考

獨活

シ
ワ

滑獨

正保年中ヨリ土當歸ノ宿根ヲ獨活

トシ或ハ全根ヲモ獨活トス非ナリ獨活羌活ヲ

一匱ノ内ニ混入シ來ルヲ長崎ニテ分テ本手馬

皮手前胡手ト稱ス此者ハ輕虛ニシテ黃色味辛

シ是真ノ獨活ナリ又文政五年年冬船ニ羌活獨

活ヲ分テテ渡スヲアリ

羌活

滑

古渡ノ本手

馬皮手ト稱スル者ハ真ノ羌活ナリ又竹ノフシ

手ト云アリ上品ナリ今「ワ」ドモ下キ」ノ根ヲ曝乾

ス紫色鞭節ニノ香氣アリテ本手ノ羌活ニ相似
タリ氣味又相近シ代用ニシテ可ナリ又官園ヨ
リ出ル所ノモノ佳ナリ

手板
發蒙

獨活ドウ 生原野春生苗高四尺許葉有細鋸齒又
有細白毛六七月開花結子 觀此種名爲獨活其

性溫散能治去風散寒但性太厚若用斟酌非地道
也 癸卯陳太 羌活 シ、ウド
イヌウド 生原野春生高四尺許

六七月開花作叢秋結子 羌活出蜀漢者佳春生

苗葉如麻六月開作叢紫色而節密羌活無疑

甲辰
陸討

此種先生鑒為土獨活中山稱之羌活繼志謹按

獨活作塊羌活節密此種節密不作塊因為羌活何

如乙己再問潘按羌獨二活神農本草三經原無

分別迨至後人始分羌獨二活治上下之病茲考此

種可以竟謂羌活也乙己陳倬為代潘○土羌活羌

一種生海邊冬生苗葉極似前種但有光澤耳

莖面有縱理微帶紫色高四尺許夏著細白花贊問

次之羌活之後土羌活癸卯潘貞與十四號同


故曰似前種甲辰陸澍○帖中羌活宜搜風發表勝濕入足太

十四號為羌活

陽經甲辰周之良鄆履仁吳美山繼志按諸家皆
鑒爲羌活則此種爲羌活一類無疑然其實不
堪爲真故選質問
之外篇云本草

本草通串卷四十五

本草通串



本草通串 冊三—冊五

日本古典全集之内

編纂者

正

宗

敦

夫

東京市豊島區長崎町三丁目一六一

發行者

合資

日本古典全集刊行會

代表社員

長

嶋

東

一

東京市豊島區長崎町三丁目一五八

印刷者

不二印刷所

高瀬

清吉

東京市豊島區長崎町三丁目二六

發行所

合資

日本古典全集刊行會

振替東京七三〇三二

昭和十四年二月十七日印刷
昭和十四年二月廿二日發行

【非賣品】





UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER
COLLECTION

*purchased from
a gift by*

THE DONNER CANADIAN
FOUNDATION

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 03056 4603

RS
180
J3S8
1937
v.11